

尼麦角林片使用说明书

【药品名称】


通用名名：尼麦角林片

商品名：乐喜林®

英文名：Nicergoline Tablets

汉语拼音：Nimaijiaolin Pian

本品主要成份为尼麦角林，其化学名为 10 α -甲氧基-1,6-二甲基麦角林-8 β -甲醇基 5'-溴烟酸酯，化学结构式如下：



分子式：C₂₄H₂₆BrN₃O₃

分子量：484.39

【性状】本品为粉红色片。

【药理毒理】本品为半合成的麦角碱衍生物。有 α 肾上腺素受体阻滞作用和血管扩张作用。可加强脑细胞能量的新陈代谢，增加氧和葡萄糖的利用。可促进神经递质多巴胺的转换而增强神经传导，加强脑部蛋白质生物合成，改善脑功能。

【药代动力学】文献报道：口服快速从胃肠吸收，1~1.5 小时后，可达最高血药浓度，清除半衰期为 2.5 小时，约 70~80%的尼麦角林或其代谢产物经肾脏排泄。

【适应症】适用于急、慢性血管性或代谢性脑功能不全（脑动脉硬化、脑血栓和栓塞、短暂性脑缺血发作）。

适用于急、慢性周围血管性功能不全（雷诺氏综合症、肢体血管闭塞性疾病及其他末梢循环不良引起的症状）头痛。

本品可用于动脉高血压、中风后偏瘫患者的辅助治疗。改善脑梗阻后遗症引起的意欲低下和情感障碍（感觉迟钝、注意力不集中、记忆力衰退、缺乏意念、忧郁、不安等）。

【用法用量】口服 每次 1~2 片（5~10mg），每日 3 次，或遵医嘱。

【不良反应】少数病人有轻微的副作用，通常与其扩张血管作用有关，一般有轻微的胃部不适，潮热潮红，嗜睡或失眠。

【禁忌】出血倾向或对尼麦角林（麦角溴烟酯）过敏者禁用。

【注意事项】1. 病人应遵医嘱使用。

2. 本品能增加降压药的作用，因此与降压药合用应慎重。

3. 肾功能不良的患者应减量。

4. 服药期间禁止饮酒。
5. 孕妇一般不宜应用，必需时，应权衡利弊。
6. 应妥善保管勿造成小孩误食。

【孕妇及哺乳期妇女药】本品缺乏足够的孕妇用药后资料。如孕妇确需使用品，需慎用。

【儿童用药】本品儿童用药的安全性和有效性尚未明确定论。

【老年患者用药】对过量使用本品，尚无经验，如果量使用，急需清除肠胃中残存药物及相应支持治疗。

【药物相互作用】人体试验发现，尼麦角林与降压药合用时能增加降压的作用。

【规格】5mg。

【包装】铝塑包装，24片/盒。

【有效期】三年。

【贮藏】遮光，密闭保存。

【批准文号】国药准字 H20000482

【生产企业】

企业名称：昆山龙灯瑞迪制药有限公司

地 址：江苏省昆山开发区黄浦江中路 258 号

邮政编码：215300

电话号码：0512-57702217

传真号码：0512-57711634

网 址：www.rotamreddy.com