

Etoposide 膠囊

主成分：Etoposide

商品名：Vepesid、VP-16 Capsule

中文商品名：滅必治軟膠囊

含量：50 毫克/膠囊

作用：

此藥是化學治療劑。

用法：

1. 請依照醫師指示按時服用，不可自行增減藥量或任意停藥。
2. 併用其他藥物治療時，請確定每種藥品的服用時間，勿任意合用。
3. 服用本藥引起噁心、嘔吐、及失去食慾是常見的現象；如有這些反應產生，仍需繼續服藥；可請教您的醫師或藥師如何減少這些反應產生。如果服藥後不久就吐出來，請告知醫師確認是否需補服此次劑量。

注意事項：

1. 本藥使您的抗菌力降低，應避免與有傳染病的人接觸；如有任何感染症狀如發燒、發冷、咳嗽、喉嚨痛、下背或腹側痛、排尿困難或疼痛等，請立即就醫。
2. 如果您曾經對此藥有過敏反應，請告知醫師。
3. 服用此藥時，除非您的主治醫師指示，否則不可打預防針、疫苗；與您親近的人（例如家人）也應避免服用口服的小兒麻痺疫苗。
4. 服用此藥期間需避孕，但勿使用避孕丸。若懷疑受孕要馬上告知醫師。
5. 服用本藥勿授乳。
6. 請注重個人衛生（尤其是口腔、牙齒、皮膚、頭髮、及手），避免刀傷（例如刮鬍子、剪指甲）、意外碰撞造成瘀血或受傷。
7. 使用本藥之前，請告知醫師目前您使用之所有藥品，以及曾服用過的抗腫瘤藥或接受之放射線治療。如有或曾經有肝臟、腎臟、心臟等疾病亦請告知醫師。
8. 請依醫師指示定期來診及做檢驗。
9. 如需看其他醫師或牙科醫師，請主動告訴醫師目前您所使用的藥品。

忘記服藥時該怎麼辦？

略過一次，依照原定時間用藥，絕不可一次服用兩倍量並請告知醫師。

此藥可能引起的副作用有哪些，如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
過敏反應（發燒、發冷、心跳過速、呼吸急促或哮喘等）	請立即就醫（至急診處）
發燒、發冷、喉嚨痛、下背或腹側痛、排尿困難或疼痛、異常出血或瘀血、血尿、血便或黑便、皮膚出現針狀紅點、氣喘或呼吸困難、暈眩、意識模糊、皮膚發疹、發癢等	請立即就醫
疲勞、口腔或唇部潰瘍、食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉等	請告知醫師，尤其是症狀持續或嚴重時
禿髮	不需治療，停藥後頭髮會再長出來

藥品該如何存放？

請參考藥袋說明。