

Hydroxyurea 膠囊

主成份：Hydroxyurea
商品名：Hydrea Capsule
中文商品名：愛治膠囊
含量：500 毫克/膠囊

作用：

Hydroxyurea 是化學治療劑。

用法：

1. 請依照醫師指示按時服用，勿自行增減藥量或任意停藥。
2. 儘量勿打開或弄破膠囊，當病人無法吞嚥膠囊時，可將內容物倒入水中後立即服用（某些物質可能不溶而漂浮其上），若有粉末灑出，請立刻用濕紙巾擦拭，並將其裝在密封袋內再丟棄，勿使小孩拿到。
3. 若合併其它藥物治療時，請確定每種藥品之服用時間，勿任意合用。
4. 服用時請多喝水以降低此藥對腎臟的副作用。
5. 服用本藥常引起噁心、嘔吐、以及腹瀉；如有這些反應產生，仍需繼續服藥；請詢問您的醫師或藥師如何減少這些反應產生。
6. 如果服藥後不久便吐出來，請告知醫師，確認是否需補服此次劑量。

注意事項：

1. 本藥使您的抗菌力降低，應避免與有傳染病的人接觸；有任何感染症狀如發燒、發冷、喉嚨痛、下背或腹側痛、排尿困難或疼痛等，請立即就醫。
2. 如果您曾對本藥過敏，請告知醫師。
3. 服用此藥期間及療程結束至少六個月均需避孕，不論男女皆須使用二種避孕方式，防止受孕。若懷疑受孕要馬上告知醫師。
4. 服用本藥勿授乳。
5. 小孩、老人對本藥作用比較敏感。
6. 請事先告知醫師您目前使用的所有藥品，以及曾經做過之任何治療。
7. 若有其它疾病，請告知醫師。
8. 請定期回診以確定療效並追蹤病情及檢查血球變化。

9. 服用此藥時，除非您的主治醫師指示，否則不可打預防針、疫苗；與您親近的人（例如家人）也應避免服用口服的小兒麻痺疫苗。
10. 請注重個人衛生（尤其是口腔、牙齒、皮膚、頭髮、及手），避免刀傷（例如刮鬍子、剪指甲）、意外碰撞造成瘀血或受傷。
11. 如需看其他醫師或牙科醫師，請主動告訴醫師目前您所使用的藥品。

忘記服藥時該怎麼辦？

想起時儘快服用，若很接近下一次服藥時間，則略過一次，依照原定時間用藥，絕不可一次服用兩倍量，並請告知醫師。

此藥可能引起的副作用有哪些，如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
咳嗽或聲音嘶啞；發燒、發冷或口腔潰瘍；下背或身側痛；手或腳有麻痛、刺痛或灼熱感；排尿疼痛或困難；黑便；尿液或糞便中摻有血；皮膚出現針狀紅點；不正常的出血或瘀血；皮膚起疹子或潰瘍；突然且嚴重的胃痛、噁心及嘔吐；異常的疲倦或虛弱；眼睛或皮膚變黃、尿液顏色變深或糞便顏色變淡、上腹痛	請立即就醫
手或足部指甲變黑；口腔或嘴唇疼痛；意識混亂；痙攣；眩暈；幻覺；頭痛；關節痛；足部或下肢水腫等	請儘速就醫
失去食慾、噁心、嘔吐、腹瀉或便秘；皮膚發紅、發疹或發癢，疲倦等	請告知醫師，尤其是症狀持續或嚴重時

停藥後您的身體需要一段時間調適，在這期間如果有下列現象產生請告知醫師：發燒、發冷、喉嚨痛、下背或腹側痛、排尿困難或疼痛、異常出血或瘀血、血尿、血便或黑便、皮膚出現針狀紅點等。

藥品該如何存放？

請參考藥袋說明。