

外

曲安奈德益康唑乳膏说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

【药品名称】

通用名称：曲安奈德益康唑乳膏

英文名称：Triamcinolone Acetonide and Econazole Cream

汉语拼音：Qu'annaide Yikangzuo Rugao

【成份】

本品为复方制剂，每克含硝酸益康唑 10 毫克、曲安奈德 1.0 毫克。辅料为：硬脂酸、单硬脂酸甘油酯、聚氧乙烯脂肪醇醚、十八醇、轻质液状石蜡、甘油、依地酸二钠、十六醇、丁基羟基苯甲醚、苯甲酸、纯化水。

【性状】 本品为白色乳膏。

【作用类别】 本品为皮肤科用药类非处方药药品。

【适应症】

- 1、伴有真菌感染或有真菌感染倾向的皮炎、湿疹；
- 2、由皮肤癣菌、酵母菌和霉菌所致的炎症性皮肤真菌病，如手足癣、体癣、股癣、花斑癣；
- 3、尿布性皮炎；
- 4、念珠菌性口角炎；
- 5、甲沟炎；
- 6、由真菌、细菌所致的皮肤混合感染。

【规格】 复方（0.1%曲安奈德和 1%硝酸益康唑）

【用法用量】

局部外用。取适量本品涂于患处，每日早晚各 1 次。治疗皮炎、湿疹时，疗程 2-4 周。治疗炎症性真菌性疾病应持续至炎症反应消退，疗程不超过 4 周。

【不良反应】

- 1、局部偶见过敏反应，如出现皮肤烧灼感、瘙痒、针刺感等。
- 2、长期使用时可出现皮肤萎缩、毛细血管扩张、色素沉着以及继发感染。

【禁忌】 皮肤结核、梅毒或病毒感染者（如疱疹、牛痘、水痘）禁用。

【注意事项】

- 1、避免接触眼睛和其他黏膜（如口腔内、鼻等）。
- 2、用药部位如有烧灼感、红肿等情况应停药，并将局部药物洗净，必要时向医师咨询。
- 3、不得长期大面积使用。
- 4、儿童、孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下使用。
- 5、连续使用不能超过 4 周，面部、腋下、腹股沟及外阴等皮肤细薄处连续使用不能超过 2 周，症状不缓解请咨询医师。
- 6、对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- 7、本品性状发生改变时禁止使用。
- 8、请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 9、儿童必须在成人监护下使用。
- 10、如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】

本品中硝酸益康唑为抗真菌药，对皮肤癣菌、霉菌和酵母菌（如念珠菌）等有抗菌活性，对某些革兰阳性菌也有效。曲安奈德为糖皮质激素，具有抗炎、止痒及抗过敏作用。

【贮藏】 密闭，在阴凉处（不超过 20℃）保存。

【包装】 铝质药用软膏管，15 克/支/盒。

【有效期】 24 个月

【执行标准】 《中国药典》2005 年版二部

【批准文号】 国药准字 H20067647

【说明书修订日期】 2008 年 5 月 30 日

【生产企业】

企业名称：上海朝晖药业有限公司

生产地址：上海市宝山区抚远路 2151 号

邮政编码：201908

电话号码：021-66866679

传真号码：021-66866681

网 址：<http://www.zhpharma.com.cn>

如有问题可与生产企业联系。