



TACHIPIRINA

500 毫克片剂

扑热息痛

开始服用此药物前，请仔细阅读此说明书的全部内容，因为其内含重要信息。

请务必完全按照说明书规定，或遵医嘱，或药剂师的建议服用本产品。

- 请保留此说明书。方便再次阅读。
- 更多信息或建议，请咨询药剂师。
- 如果出现任何不良反应，请咨询医生或药剂师。该部分包括本说明书中未列出的任何可能发生的不良反应。参见第 4 部分。
- 如服用本产品三天后症状未缓解或症状加重，请务必咨询医生。

此说明书包含以下内容：

1. Tachipirina 是什么及其用途
2. 服用 Tachipirina 之前需要了解的信息
3. Tachipirina 的服用方法
4. 可能发生的不良反应
5. Tachipirina 的贮藏方法
6. 包装内容物及其他信息

1. Tachipirina 是什么及其用途

Tachipirina 含有有效成分对乙酰氨基酚，可用于退烧（退烧药）和缓解疼痛（镇痛药）。

Tachipirina 用于治疗**成人、青少年和儿童**的下列症状：

- 流行性感冒、发疹性疾病（儿童和青少年典型传染病）、急性呼吸道疾病等发热症状。
- 各种类型和起因的疼痛（头痛、神经痛、肌肉痛等中度疼痛）。

如服用本产品三天后您/您的孩子的症状未缓解或症状加重，请务必咨询医生。

2. 服用 Tachipirina 之前需要了解的信息

禁忌

- 如果您/打算服用本药品的患者对对乙酰氨基酚或本药品的任何其他成分（第 6 部分所列成分）过敏，请禁用本药品。

警告和注意事项

在服用 Tachipirina 前请咨询医生或药剂师。

若存在下列情况，应谨慎服用本产品：

- 长期或过量饮酒（每天喝三杯甚至更多酒精类饮料）
- 患有厌食症（以食欲不振或食欲减少为特征的行为障碍疾病）
- 患有暴食症（行为障碍症，患者摄入过多食物，然后采用各种方法辅助消化这些食物）
- 患有恶病质（由慢性疾病导致的极度瘦弱、肌肉质量下降和皮肤变薄症状）
- 长期饮食不当（慢性营养不良）
- 患有脱水症（体内水分/液体严重流失）
- 患有低血容量症（血液循环量减少）
- 患有会引起身体机能损伤的肝脏疾病（肝损伤、肝炎、吉伯特氏症候群）
- 正在使用改变肝功能的药物进行联合治疗（参见“其他药物和 Tachipirina”）
- 缺乏葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（通常存在于人体中的一种物质，缺乏该物质可导致血液疾病）
- 患有溶血性贫血（红细胞破坏）。

高剂量和/或长期服用

高剂量和/或长期服用本药品会导致肾脏和血液变化，其中一些情况会很严重。在这种情况下，医生会进行特殊检查，监测一段时间内的肝肾功能和血液成分。在服用本药品之前，请**告知**您的医生，打算服用本药品的患者是否患有肝肾疾病。

儿童和青少年

儿童和青少年可服用 Tachipirina（参加第 3 部分“Tachipirina 的服用方法”）。

其他药物和 Tachipirina

告诉医生或药剂师是否正在服用、最近服用过或可能服用了其他药物。

特别是，如果打算服用本药品的患者正在服用以下药物，请告知医生：

- **含有对乙酰氨基酚的药品。**在使用扑热息痛治疗期间，在服用或给孩子服用任何其他药物之前，请检查其是否含有对乙酰氨基酚，因为高剂量服用对乙酰氨基酚可能会产生严重的不良反应；
- **减慢胃排空速度的药物**（例如抗胆碱能药物、阿片类药物），这些药物会延缓 Tachipirina 的药效；
- **加速胃排空速度的药物**（例如胃肠蠕动促进剂），这些药物会加速 Tachipirina 的药效；
- **消胆胺**（一种用于降低血液中胆固醇水平的药物），它会削弱对乙酰氨基酚的药效；
- **氯霉素**（一种抗生素），它会增加产生不良反应的风险；
- **抗凝血剂**（用于改善血流的药品）。在使用大剂量扑热息痛（每天 4 克，服用至少 4 天）治疗时，服用或给儿童服用 Tachipirina 须严格遵医嘱
- **利福平**（一种抗生素）；
- **西咪替丁**（用于治疗胃溃疡的药品）；
- **抗癫痫药**（用于治疗癫痫的药品），例如格鲁米特、苯巴比妥或卡马西平；
- **齐多夫定**（用于治疗艾滋病的药品）。

这些药品与 Tachipirina 一同使用须遵医嘱。

干扰验血：

如果服用该药物的患者需要验血，请注意，服用对乙酰氨基酚会干扰尿酸血症和糖血症的测定。

Tachipirina 与酒精

如果患者长期或过量饮酒（每天喝三杯甚至更多酒精类饮料），则应谨慎使用 Tachipirina，因为存在中毒的风险（参见“警告和注意事项”以及“如果超剂量服用 Tachipirina”）。

怀孕与哺乳

如果怀孕或正在哺乳，认为可能已经怀孕或正在备孕，请在服用此药物之前咨询医生或药剂师。

如有需要，可在怀孕期间使用 Tachipirina。应在尽可能最短时间内使用能够减轻疼痛和/或退烧的最低剂量。如果疼痛和/或发烧症状未改善或服药次数需增加，请联系医生。仅在实际必要时并遵医嘱，方可在哺乳期间服用本药品。

对驾车和操作机器的影响

Tachipirina 不影响驾车和操作机器的能力。

3. Tachipirina 的服用方法

请务必完全按照说明书规定, 或遵医嘱, 或药剂师的建议服用本产品。如不确定, 请咨询医生或药剂师。

成人

建议剂量为一次一片, 4 小时后根据需要重复用药一次, 一天不超过 6 次。
如果出现剧烈疼痛或高烧, 必要时至少在 4 小时后重复服用两片 500 毫克片剂。
成人的最大口服剂量为每天 3000 毫克扑热息痛 (参见“如果超剂量服用 Tachipirina”)。

儿童和青少年用药

儿童必须遵循依据儿童体重确定的剂量。医生会根据孩子的体重选择最合适的剂量。我们提供各年龄阶段 (作为体重近似值) 所对应的剂量供您参考。

这种片剂可分成两等份。

体重	年龄	剂量	一日几次?	最高日剂量 (24 小时内)
21-25 kg	约 6.5 岁 - 8 岁以下	每次 ½ 片	必要时在 4 小时后重复用药一次。 24 小时内不超过 6 次	3 片
26-40 kg	约 8 岁 - 11 岁	每次 1 片	必要时在 6 小时后重复用药一次。 24 小时内不超过 4 次	4 片
41-50 kg	约 12 岁 - 15 岁	每次 1 片	必要时在 4 小时后重复用药一次。 24 小时内不超过 6 次	6 片
体重超 50 kg	约 15 岁以上	每次 1 片	必要时在 4 小时后重复用药一次。 24 小时内不超过 6 次	6 片

对于体重不足 21 公斤的儿童, 市场上还有其他特殊剂型的 Tachipirina。请咨询医生或药剂师意见。

如果您/您的孩子有严重的肝损伤 (肝功能严重减退)

如果医生诊断出您或您的孩子有严重的肝损伤, 则两次给药之间必须至少间隔 8 个小时。

治疗持续时间

未咨询医生, 不得连续 3 天服用 Tachipirina。对于连续 3 天以上服药, 必须经过医生评估是否有必要。

如果超剂量服用 Tachipirina

如果意外摄入过量 Tachipirina, 须立即联系医生或前往最近的医院就诊。

症状

如果意外摄入极高剂量的扑热息痛, 您/您的孩子可能在服药后的前 12-48 小时会出现以下症状:

- 厌食 (食欲不振或食欲减少)、恶心呕吐, 随后一般状况明显恶化
- 血液检测指标发生改变 (血中胆红素水平、乳酸脱氢酶水平、肝转氨酶水平升高, 凝血酶原水平降低)
- 可能导致昏迷或死亡的肝脏损伤。

服用过量的扑热息痛会增加中毒的风险, 并可能导致死亡, 尤其是在下列情况下:

- 服用药物的患者患有肝病
- 慢性酒精中毒
- 服用该药品的患者长期饮食不当 (慢性营养不良)
- 服用该药物的患者正在服用其他能增强肝功能的药品或物质。

治疗

医生会根据症状的性质和严重程度开具最合适的支持疗法。

如果忘记服用 Tachipirina

不得服用双倍剂量来弥补漏服的剂量。

如果停止服用 Tachipirina

如果您对此药物的使用还有其他疑问, 请咨询医生或药剂师。

4. 可能发生的不良反应

和所有的药物一样, 此药物也会引起不良反应, 尽管不是每个人都会有不良反应。

如果您/您的孩子出现以下任何不良反应, 请**立即停用**该药物进行治疗并联系医生:

- **过敏反应:**
 - 皮肤发红、瘙痒 (荨麻疹)
 - 喉咙肿胀 (喉头水肿)
 - 手部、脚部、脚踝、脸部、嘴唇、舌头和/或喉咙肿胀 (血管性水肿);
 - 严重的过敏反应 (过敏性休克)。

此外, 服用本药品的患者可能会出现以下不良反应, 有关这些不良反应的资料不足, 无法确定不良反应的出现频率。

- 血小板计数减少 (血小板减少症)
- 白细胞计数减少 (白细胞减少症/粒细胞缺乏症)
- 还原血红蛋白, 一种在血液中运输氧气的物质 (贫血)
- 眩晕
- 胃肠功能紊乱
- 肝功能受损
- 肝组织炎症 (肝炎)
- 红斑、大疱性皮损伴皮肤脱离、水疱、皮疹 (多形性红斑、史蒂文斯-约翰逊综合征、中毒性表皮坏死松解症)
- 肾功能受损 (急性肾衰竭)
- 肾脏炎症 (间质性肾炎)
- 尿中带血 (血尿症)
- 排尿停止或产尿量减少 (无尿症)。

极罕见病例报告了严重的皮肤反应。

报告不良反应

如果出现任何不良反应, 请咨询医生或药剂师。该部分包括本说明书中未列出的任何可能发生的不良反应。您也可以通过此网站上的国家报告系统直接报告不良反应: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>。通过报告不良反应, 您可以帮助提供有关此药物安全性的更多信息。

5. Tachipirina 的贮藏方法

请将本产品放在儿童看不见够不着的地方。
请勿在药盒上写明的有效期 (EXP) 之后使用此药物。有效期至是指标示月份的最后一天。
在原包装中可保存半片药剂 24 小时。
本药品不需要特殊的储存条件。

请勿混入废水或生活垃圾丢弃任何药物。询问药剂师如何丢弃不再使用的药物。这些措施将有助于保护环境。

6. 包装内容物及其他信息

Tachipirina 所含成分

- 有效成分: 对乙酰氨基酚 (每片含有 500 mg 对乙酰氨基酚)

- 其他成分：微晶纤维素、聚维酮、预糊化淀粉、硬脂酸、交联羧甲基纤维素钠。

Tachipirina 的外观和包装内容物

Tachipirina 呈白色、圆形、双凸片状，一侧中央有断裂线。药片使用白色泡罩包装，每盒 10、20 或 30 片 500 毫克可分片剂。

并非所有包装尺寸都将上市销售。

营销授权持有人

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F.
S.p.A.- Viale Amelia, 70 – 00181
Rome, 意大利。

生产商

A.C.R.A.F. S.p.A.- Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 意大利安科纳
ISTITUTO DE ANGELI S.r.l. - Località Prulli 103/C, 50066
Reggello, Florence, 意大利。

本包装说明书最后一次修订于 2019 年 12 月