

核准日期：2007.03.28

修改日期：2011.05.31

复方氨林巴比妥注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

严禁用于食品和饲料加工

【药品名称】

通用名称：复方氨林巴比妥注射液

英文名称：Compound Aminopyrine and Barbitol Injection

汉语拼音：Fufang Anlinbabituo Zhusheye

【成份】本品为复方制剂，其组分为：每 2ml（支）含氨基比林 0.1g，安替比林 40mg，巴比妥 18mg。

辅料：依地酸二钠。

【性状】本品为无色或微黄色的澄明液体。

【适应症】主要用于急性高热时的紧急退热，对发热时的头痛症状也有缓解作用。

【规格】复方制剂。

【用法用量】肌内注射。

成人一次 2ml（1 支），或遵医嘱。在监护情况下极量为一日 6ml（3 支）。

小儿 2 岁以下一次 0.5~1ml（ $\frac{1}{4}$ ~ $\frac{1}{2}$ 支），2~5 岁一次 1~2ml（ $\frac{1}{2}$ ~1 支），大于 5 岁一次 2ml（1 支）。

本品不宜连续使用。

【不良反应】1. 过敏性休克，表现为胸闷、头晕、恶心呕吐、血压下降、大汗淋漓等症状，应立即停药并抢救。

2. 粒细胞缺乏、紫癜，有时急性起病。

3. 皮疹、麻疹、表皮松解症等。

【禁忌】对吡唑酮类或巴比妥类药物过敏者，及用本品有过敏史者严禁使用。

【注意事项】1. 肌注前应向病人询问是否有吡唑酮类或巴比妥类药物过敏史，有过敏史者应避免使用本品，过敏性体质者亦应慎用。

2. 不得与其它药物混合注射。

3. 长期使用可引起粒细胞减少，再生障碍性贫血及肝肾损坏等严重中毒反应。

4. 呼吸系统有严重疾病及呼吸困难者慎用本品。

5. 体弱者慎用。

6. 本品仅对症治疗，在解除高热症后应对因治疗，在应用本品无明显效果时应改用其它方法治疗，避免盲目大量应用本品。

【孕妇及哺乳期妇女用药】尚不明确。

【儿童用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【老年用药】老年患者的肝肾功能有一定程度的生理性减退，应采用较小治疗量。

【药物相互作用】巴比妥有抑制呼吸中枢作用，对能抑制呼吸的药物有加强作用，如硫酸庆大霉素等，应禁止同时应用。

【药物过量】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药理毒理】本品为解热镇痛药。氨基比林和安替比林同属于吡唑酮类解热镇痛药，能抑制下视丘前列腺素的合成和释放，恢复体温调节中枢感受神经元的正常反应性而起退热作用；同时还通过抑制前列腺素等的合成而起镇痛作用。氨基比林并能抑制炎症局部组织中前列腺素的合成和释放，稳定溶酶体酶，影响吞噬细胞的吞噬作用而起到抗炎作用。合用巴比妥，可加强镇痛作用。

【药代动力学】

氨基比林 $t_{1/2}$ 为 1~4 小时，大部分在肝内去甲基成为 4-氨基安替比林，再经乙酰化变成 N-乙酰氨基安替比林，自尿中排出。

安替比林 $t_{1/2}$ 约 12 小时，肝中代谢羟化，与葡萄糖醛酸结合在尿中排出，约 5% 为原形从尿中排出。

【贮藏】遮光，密闭保存。

【包装】2ml 安瓿，10 支/盒。

【有效期】24 个月。

【执行标准】国家药监局标准 WS-10001-(HD-1327)-2003。

【批准文号】国药准字 H37023824。

【生产企业】



企业名称：山东新华制药股份有限公司

生产地址：山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号

邮政编码：255005

电话号码：0533-2166666

传真号码：0533-2184991

网址: www.xhzy.com