# MANUAL DE PRUEBAS Y TOMA DE MUESTRAS

## MTEC 02 V72 del 31 de mayo del 2023

## LAC - Laboratorio de Análisis Clínicos

TelFax: (598) 2487 - 0180 / (598) 2487 - 6162
Email: acliente@lac.com.uy / Web: www.lac.com.uy
Avda. Italia 2595 | Montevideo | 11600 | Uruguay

Aprobado por:

Dr. Milton Fornella
Representante de la Dirección

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| 1,3-BET-D-GLUCANO (SFUNG) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | La toma de sangre debe ser realizada en un tubo con sistema de vacío (tubo seco con gel) exclusivo para realizar este estudio. Enviar el tubo primario luego de centrifugar, sin abrirlo. El paciente debe tener un ayuno de 6 a 8 horas. | 7 |
| 11-DEOXYCORTICOSTERONA (DOCS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 12 |
| 2.5 HEXANODIONA DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Al final de la jornada laboral. | 15 |
| 25-OH VITAMINA D TOTAL | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 8 |
| 3 ALFA ANDROSTANEDIOL GLUCURONIDE (FAGES) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 20 |
| 3-HIDROXI-3-METILGLUTARIL COENZIMA A REDUCTASA AC.ANTI (HMGES) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 12 |
| 3-HYDROXY-3-METHYLGLUTARIL COENZYMA-A (HMGCR) REDUCTASA ANTICUERPOS DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Separar en las dos horas siguientes a la extracción. | 7 |
| 5´NUCLEOTIDASA (F5NUL ) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 9 |
| 5-HIDROXITRIPTAMINA (SERU) DETERMINACIÓN EN ORINA DE 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas. | 15 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| 5-OH- INDOLACETICO (HIAAR) DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| 5-OH- INDOLACETICO (HIAA) DETERMINACIÓN EN ORINA DE 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones. | 7 |
| 11 DEOXYCORTISOL (DCORT) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO | | 12 |
| 17 HIDROXI PROGESTERONA (30 min) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO 30 minutos | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno de 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y enviar al laboratorio a la brevedad. Si no fuera posible separar el suero y congelar. Enviar al laboratorio el suero congelado. | 7 |
| 17 HIDROXI PROGESTERONA (60 min) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO 60 minutos | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y enviar al laboratorio a la brevedad. Si no fuera posible separar el suero y congelar. Enviar al laboratorio el suero congelado. | 7 |
| 17 HIDROXI PROGESTERONA C/ EXTRACCIÓN SOLV.ORG. DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Enviar adjunto la información sobre el peso al nacer y edad gestacional. | 11 |
| 17 HIDROXI PROGESTERONA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO IM | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno de 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y enviar al laboratorio a la brevedad. Si no fuera posible separar el suero y congelar. Enviar al laboratorio el suero congelado. En niños menores de 6 meses enviar adjunto la información sobre el peso al nacer y edad gestacional. | 7 |
| 21 HIDROXILASA ANTICUERPOS ANTI (21OH) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 12 |
| 21-HIDROXILASA PERFIL DE DEFICIT (CAH21) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | | 9 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| 25-HIDROXIVITAMINA D2-D3 (25HDN) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 8 |
| AANEXINA V ANTICUERPOS ANTI IGG-M (300230) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | | 19 |
| ACANTHAMOEBA ESPECIES PCR DETERMINACIÓN EN CÓRNEA | CÓRNEA PCR | CÓRNEA SUERO FISIOLÓGICO | | 3 |
| ACETIL COLINA ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR (ARBI) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| ACETILCOLINESTERASA ERITROCITARIA (ACHS ) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Extraer dos tubos EDTA. La muestra debe recibirse en el laboratorio el mismo día de la recolección, los días lunes o miércoles antes de las 10:00. | 10 |
| ACETONA (VLTU) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Al final de la jornada laboral. | 7 |
| ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO (SALCA) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| ÁCIDO AMINOLEVULÍNICO DEHIDRATASA (ALAD) DETERMINACION EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 8 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) VITC DETERMINACIÓN EN PLASMA | HEPARINA VITA C | HEPARINA | 1. Ayuno (12-14 horas). Niños efectuar toma antes de la siguiente comida. Se puede beber agua. 2.Acondicionar inmediatamente la muestra en hielo. 3.Dentro de las 4 horas siguientes, centrifugar a 4ºC, alicuotar el plasma en un tubo protegido de la luz y congelar. | 15 |
| ÁCIDO BETA HIDROXIBUTIRATO (BHYD ) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 6-8 horas. Centrifugar en las dos horas siguientes a la extarcción. Enviar refrigerado. | 6 |
| ÁCIDO FENILGLIOXÍLICO DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Al final de la jornada laboral. | 15 |
| ÁCIDO FENILMERCAPTÚRICO DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Al final de la jornada laboral. | 15 |
| ÁCIDO FÓLICO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| ÁCIDO HOMOVANÍLICO & ÁCIDO VANIL MANDELICO (PEDIATRÍA, VH) EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada. | 7 |
| ÁCIDO HOMOVANÍLICO (HVA) DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| ÁCIDO HOMOVANÍLICO [HVA] DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas. | 15 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ÁCIDO MANDÉLICO DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Al final de la jornada laboral. | 15 |
| ÁCIDO METIL-MALÓNICO (MMAS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 8 |
| ÁCIDO OXALACÉTICO (OXU) DETERMINACIÓN EN ORINA (OXALURIA) | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas. Se puede solicitar en muestra aislada en menores de 17 años. | 15 |
| ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (FFTRU ) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Al final de la jornada laboral. | 15 |
| ÁCIDO T-T-MUCÓNICO DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Al final de la jornada laboral. | 15 |
| ÁCIDO ÚRICO (FUABF) DETERMINACIÓN EN LÍQUIDO SINOVIAL | LÍQUIDO SINOVIAL | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 8 |
| ÁCIDO ÚRICO DETERMINACIÓN EN ORINA DE 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones para recolección de orina 24 horas. | 3 |
| ÁCIDO ÚRICO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| ÁCIDO VALPROICO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Realizar toma antes de ingerir medicamento. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ÁCIDO VALPROICO PICO Y VALLE DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| ÁCIDO VANIL MANDÉLICO (VMA) DETERMINACIÓN EN ORINA 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones para recolección de orina 24 horas. | 8 |
| ÁCIDO VANIL MANDÉLICO (VMAR) DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| ÁCIDOS BILIARES TOTALES Y FRACCIONADOS (BAFS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 12 horas. | 9 |
| ÁCIDOS GRASOS DE CADENA LARGA (FAPCP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo de 12 horas. No beber alcohol en las 24 horas previas a la extracción. En caso de enviar la muestra, separar el suero y congelarlo en los siguientes 45 minutos luego de la extracción. | 10 |
| ÁCIDOS GRASOS DE CADENA MUY LARGA PEROXISOMALES (POX) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo de 12 horas. No beber alcohol en las 24 horas previas a la extracción. En caso de enviar la muestra, separar el suero y congelarlo en los siguientes 45 minutos luego de la extracción. | 10 |
| ÁCIDOS GRASOS LIBRES (NEFA) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo de 12 horas. No beber alcohol en las 24 horas previas a la extracción. En caso de enviar la muestra, separar el suero y congelarlo en los siguientes 45 minutos luego de la extracción. | 7 |
| ÁCIDOS ORGÁNICOS (SCREENING) OAU DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 6 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ACIL-CARNITINAS (ACRN) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno de 8 horas. | 10 |
| ACTH-ADRENOCORTICOTROFINA DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA CON EDTA | EDTA / TAPÓN LILA | Se requiere ayuno de 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio el plasma congelado. | 7 |
| ACTH-CORTISOL POST ACTH DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA EDTA | EDTA / TAPÓN LILA | Se requiere ayuno de 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio el plasma congelado. | 7 |
| ACTH-RITMO DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA EDTA | EDTA / TAPÓN LILA | Se requiere ayuno de 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio el plasma congelado. | 7 |
| ACUAPORINA-4- ANTICUERPOS ANTI (NMOFC) DETERMINACIÓN EN LCR | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Mínimo 2 ml de LCR | 9 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ACUAPORINA-4- ANTICUERPOS ANTI (NMOFS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 9 |
| ACUAPORINA-4- ANTICUERPOS ANTI PRUEBA REFLEJA TÍTULO (NMOTC) LCR | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 11 |
| ACUAPORINA-4- ANTICUERPOS ANTI PRUEBA REFLEJA TÍTULO (NMOTS) SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 11 |
| ADALIMUMAB CONCENTRACIÓN & ANTICUERPOS ANTI (ADALX) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 9 |
| ADAMTS13 ACTIVIDAD E INHIBIDOR (ADM13) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 17 |
| ADENOSINA DESAMINASA DETERMINACIÓN EN LÍQUIDO SINOVIAL | LÍQUIDO SINOVIAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| ADENOSINA DESAMINASA (FADBC) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| ADENOSINA DESAMINASA (FADDC) DETERMINACIÓN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 2 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ADENOSINA DESAMINASA (FADPC) DETERMINACIÓN EN LÍQUIDO PERICÁRDICO | LÍQUIDO PERICÁRDICO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 14 |
| ADENOSINA DESAMINASA (FADPL) DETERMINACIÓN EN LIQUIDO PLEURAL | LIQUIDO DE PUNCIÓN | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Enviar a la brevedad al LAC refrigerado. | 14 |
| ADENOSINA DESAMINASA (FADPT) DETERMINACIÓN EN ASCITIS | LIQUIDO PERITONEAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Es necesario llenar el formulario del MSP. Enviar domicilio y teléfono del paciente. Coordinar con el LAC. | 10 |
| ADENOSINA DESAMINASA MSP DETERMINACIÓN EN LAVADO BRONQUIO ALVEOLAR | LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| ADENOSINA DESAMINASA MSP DETERMINACIÓN EN LÍQUIDO PERICÁRDICO | LÍQUIDO pericárdico | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| ADENOSINA DESAMINASA MSP DETERMINACIÓN EN LÍQUIDO PLEURAL | LÍQUIDO PLEURAL | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| ADENOSINA DESAMINASA MSP DETERMINACIÓN EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | | 5 |
| ADENOVIRUS ING | FAUCES | ASPIRADO NF / EX. NASAL | | 1 |
| ADENOVIRUS DETERMINACIÓN EN MATERIA FECAL | MATERIA FECAL | FRASCO / MATERIA FECAL | | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ADENOVIRUS (LADV) DETECCIÓN MOLECULAR EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 8 |
| ADENOVIRUS (LADV) DETERMINACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| ADENOVIRUS DNA CUANTIFICACIÓN (FADNA) EN PLASMA | PLASMA CON EDTA | EDTA / TAPÓN LILA | | 10 |
| ADENOVIRUS DNA DETECCIÓN MOLECULAR (LCADP) EN PLASMA | PLASMA CON EDTA | EDTA / TAPÓN LILA | | 10 |
| ADmark APOLIPOROTEINA E GENOTIPIFICACIÓN ANÁLISIS FAPG | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 20 |
| ADN EXTRACCIÓN | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 14 |
| AGLUTININAS ANTI RH (Coombs Indirecto) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| AGLUTININAS ANTI RH TITULO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| AGREGACION PLAQUETARIA (ADP & EPINEFRINA) | PLASMA | 4 CITRATO / TAPÓN CELESTE | Ayuno de 8 horas. Coordinar con LAC. Ver Manual de Instrucciones Agregación Plaquetaria. | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| AGREGACIÓN PLAQUETARIA CON ÁCIDO ARAQUIDÓNICO | PLASMA | 4 CITRATO / TAPÓN CELESTE | Ayuno de 8 horas. Coordinar con LAC. Ver Manual de Instrucciones Agregación Plaquetaria. | 10 |
| AGREGACIÓN PLAQUETARIA RISTOCETINA ADP & EPINEFRINA | PLASMA CITRATO | CITRATO / TAPÓN CELESTE | Ayuno de 8 horas. Coordinar con LAC. Extraer 4 tubos de citrato. Ver Manual de Instrucciones Agregación Plaquetaria. | 10 |
| ALBÚMINA DETERMINACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| ALBUMINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| ALCOHOL - ETANOL (VLTU) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada | 7 |
| ALCOHOLEMIA - ETANOL DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 1 |
| ALDOLASA (ALS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo de 4 horas. Centrifugar y separar el suero antes de pasada una hora de la extracción. Enviar suero refrigerado. | 6 |
| ALDOSTERONA BASAL (ALDS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Ver Manual de Instrucciones. | 7 |
| ALDOSTERONA DETERMINACIÓN EN ORINA 24HS | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas. | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ALFA 1 ANTITRIPSINA (A1AF) DETERMINACIÓN EN MATERIAS FECALES | MATERIA FECAL | FRASCO TAPA AZUL / WEBER | Muestra aislada. | 6 |
| ALFA 1 ANTITRIPSINA (AAT) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 6 |
| ALFA 1 ANTITRIPSINA FENOTIPOS (A1APP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 10 |
| ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA (FA1GP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| ALFA 1 MICROGLOBULINA (RA1M) DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada. | 10 |
| ALFA FETO PROTEÍNA (AFP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| ALFA FETO PROTEINA (AFPPT) DETERMINACIÓN EN LÍQUIDO PERITONEAL | Líquido Peritoneal | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 5 |
| ALFA FETO PROTEÍNA (AFPSF) DETERMINACIÓN EN LCR | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ALFA FETO PROTEÍNA DETERMINACIÓN EN LIQUIDO AMNIÓTICO | LIQUIDO AMNIÓTICO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | | 3 |
| ALFA GALACTOSIDASA (AGA) DETERMINACIÓN EN LEUCOCITOS | SANGRE ENTERA ACD | ACD TAPÓN DORADO | Ayuno de 8 horas. | 18 |
| ALFA GALACTOSIDASA (AGAS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO CONGELADO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 14 |
| ALFA GLUCOSIDASA ÁCIDA (PDBS) ACTIVIDAD POMPE EN SANGRE | PUNCIÓN DE TALÓN | PAPEL DE FILTRO | La muestra debe ser enviada en papel de filtro (Whatman o Ahlstrom) como el de screening para el recién nacido. Se requieren dos spots / manchas. Se deberá dejar secar la sangre durante 3 horas. No utilizar capilares con EDTA. No permitir que la muestra esté al sol o que reciba calor directo. Enviarla en un sobre a temperaturas ambiente. | 7 |
| ALPHA 2 ANTIPLASMINA INHIBIDOR (APSM) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Extraer en tubo de Citrato, colocar el tubo a temperatura de heladera y enviarlo al laboratorio a la brevedad. Centrifugar y congelar; de ser posible a -40º. | 10 |
| ALPHA-N-ACETYLGLUCOSAMINIDASA (ANAS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 15 |
| ALPRAZOLAM (FALPX) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE ENTERA HEPARINIZADA | HEPARINA | Ayuno mínimo 8 horas / realizar toma antes de ingerir medicamento. | 8 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ALUMINIO (AL) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | TUBO SECO METALES | Ayuno mínimo de 8 horas. Recolectar la sangre en tubo especial para metales proporcionado por el laboratorio. Centrifugar la muestra luego de 30 minutos de la extracción y antes de las 4 horas. Transferir el suero cuidadosamente sin usar pipeta a un tubo seco limpio y sin gel proporcionado por el laboratorio. | 15 |
| ALUMINIO (ALU) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA 24 HS | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas. | 15 |
| AMIKACINA PICO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO TOMA DOS | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO | | 3 |
| AMIKACINA VALLE DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO | | 3 |
| AMILASA DETERMINACIÓN EN LÍQUIDO BIOLÓGICO | A DEFINIR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| AMILASA DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| AMILASA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| AMILASA PANCREÁTICA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| AMILASA TOTAL Y PANCREÁTICA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| AMILOIDE PROTEÍNA IDENTIFICACIÓN (AMPIP) EN BLOQUE DE PARAFINA | AP | AP | | 18 |
| AMINOÁCIDOS (AACSF) DETERMINACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |
| AMINOÁCIDOS (AAQP) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. La muestra debe ser enviada al laboratorio o centrifugada en las cuatro horas siguientes a la extracción; en este caso separar el plasma. | 9 |
| AMINOÁCIDOS DETERMINACIÓN CUANT. (AAPD) EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada. | 10 |
| AMINOLEVULÍNICO ÁCIDO (ALAUR) DETERMINACIÓN EN MUESTRA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | El paciente debe absetenerse de beber alcohol en las 24 horas previas a la toma de la muestra. | 11 |
| AMIODARONA (AMIO) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| AMITRIPTILINA DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| AMONÍACO DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA dericación | Envío directo AESM (Asociación Española) | 3 |
| ANAEROBIOS INVESTIGACIÓN DE ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | ANAEROBIOS | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 5 |
| ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM (ANAP) ANTICUERPOS ANTI IGG DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 8 |
| ANCA AC. ANTI CITOPLASMA NEUTRÓFILOS DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| ANCA DETERMINACIÓN (MPO,PR3) SEMICUANTITATIVA EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 8 |
| ANDROSTENEDIONA (ANST) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| ANEXINA V ANTICUERPOS ANTI IGG-M DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | | 19 |
| ANFETAMINAS DETECCIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| ANFETAMINAS (FAMP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | | 13 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ANGIOTENSINA I (FANGI) DETERMINACION EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Extraer la sangre en un tubo SANGRE/EDTA. Separar el plasma inmediatamente después y enviar 3 ml de EDTA plasma congelado en el vial de plástico .<br>El paciente debe estar en una dieta normal de sodio, 110 mEq de sodio.<br>El paciente debe estar en una postura reclinada por lo menos 30 minutos antes de extraer la muestra. | 15 |
| ANGIOTENSINA II (FANG) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Extraer la sangre en un tubo SANGRE/EDTA. Separar el plasma inmediatamente después y enviar 3 ml de EDTA plasma congelado en el vial de plástico .<br>El paciente debe estar en una dieta normal de sodio, 110 mEq de sodio.<br>El paciente debe estar en una postura reclinada por lo menos 30 minutos antes de extraer la muestra. | 15 |
| ANTI CARDIOLIPINAS IGA (ACLIP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 8 |
| ANTI MITOCONDRIALES (AMA) AC. ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| ANTI MULLERIANA HORMONA (SUST.INH) AMH DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 8 |
| ANTI NUCLEO-CITOPLASMA ANTICUERPOS (ANA-HEP2) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| ANTI NUCLEO-CITOPLASMA ANTICUERPOS PANEL DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ANTICOAGULANTE LUPICO (INHIBIDOR) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA CITRATO | CITRATO / TAPÓN CELESTE | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 7 |
| ANTICUERPOS IRREGULARES ESTUDIO DE | SANGRE TOTAL | 2 EDTA / TAPÓN LILA derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| ANTIESTREPTOLISINA O DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| ANTÍGENO CARBOHIDRATADO CA 125 DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| ANTÍGENO CARBOHIDRATADO CA 15.3 EN LIQUIDO PANCREÁTICO | LIQUIDO PANCREÁTICO | A definir | | 15 |
| ANTÍGENO CARBOHIDRATADO CA 19.9 EN LIQUIDO PANCREÁTICO | LIQUIDO PANCREÁTICO | A definir | | 15 |
| ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (PFCEA) DETERMINACIÓN EN LÍQUIDO PLEURAL | LÍQUIDO PLEURAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 6 |
| ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) DETERMINACIÓN EN LÍQUIDO PERITONEAL | Líquido Peritoneal | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 6 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO [CEA] EN LIQUIDO PANCREÁTICO | LIQUIDO PANCREÁTICO | A definir | | 6 |
| ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO [CEASF] EN LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 6 |
| ANTÍGENO PROSTÁTICO ESP.TOT.&LIBRE DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | 24 horas previas a la realización del examen el paciente no deberá mantener relaciones sexuales, andar a caballo o en bicicleta, o desarrollar actividades similares. El paciente deberá concurrir para la extracción de sangre con 8 horas de ayuno. | 3 |
| ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECIFICO (PSA) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | 24 horas previas a la realización del examen el paciente no deberá mantener relaciones sexuales, andar a caballo o en bicicleta, o desarrollar actividades similares. El paciente deberá concurrir para la extracción de sangre con 8 horas de ayuno. | 3 |
| ANTÍGENO SOLUBLE HEPÁTICO (SLA) ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| ANTÍGENOS NEUMOCOCCICOS DETERMINACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 1 |
| ANTÍGENOS NEUMOCOCCICOS DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ANTITROMBINA III DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA CITRATO | CITRATO / TAPÓN CELESTE | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |
| APOLIPOPROTEÍNA A1 (APOA1) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 5 |
| APOLIPOPROTEÍNA B (APOLB) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 5 |
| ARBOVIRUS PANEL DE ANTICUERPOS ANTI IGG-IGM (ABOPC) DETERMINACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| ARILSULFATASA A ACTIVIDAD EN LEUCOCITOS (ARSAW) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE ENTERA ACD | ACD TAPÓN DORADO | Ayuno de 8 horas. | 21 |
| ARSÉNICO (ASB) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 7 |
| ARSÉNICO TOTAL (ARSO) DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | METALES ORINA | Al final de la jornada laboral. | 8 |
| ARSÉNICO TÓXICO ESPECIACIÓN PRUEBA REFLEJA (SPAS) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ARYLSULFATASA A ACTIVIDAD EN LEUCOCITOS (ARSAW) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE ENTERA ACD | ACD TAPÓN DORADO | Ayuno de 8 horas. | 21 |
| ASCA AC. ANTI SACCAROMYCES (GASCA,AASCA) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 4 |
| ASPERGILLUS ANTICUERPOS ANTI (FASPG) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| ASPERGILLUS FLAVUS AC. ANTI IGE (FAFE) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| ASPERGILLUS FUMIGATUS AC. ANTI IGE (ASP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| ASPERGILLUS NIGER AC. ANTI IGE (ASPG) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| ATAXIA DE FRIEDREICH FRAXITIN (FFRWB) CUANTIFICACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 30 |
| ATAXIA TELANGECTASIA AMT GEN SECUENCIACIÓN (ZZW147-90586) | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 84 |
| AUTOHEMOLISIS TEST DE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Se realiza los días miércoles. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| AZATIOPRINA (FAZAT) como 6-Mercaptopurina DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Debido al corto tiempo de vida media de este fármaco, se recomienda realizar la extracción de sangre en las primeras 2 horas tras su administración. | 15 |
| B-LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA / LINFOMA FISH (BALPF) MENOR DE 30 DETERMINACIÓN EN SANGRE | Heparina sódica | Heparina sódica | | 18 |
| BABESIA ESPECIES PCR (LBAB) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 8 |
| BABESIA MICROTI (BABG) ANTICUERPOS ANTI IGG DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 8 |
| BACILOSCOPIA EN ASPIRADO GÁSTRICO ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | ASP.GÁSTRICO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| BACILOSCOPÍA EN LAVADO BRONQUIO ALVEOLAR CHLA | LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |
| BACILOSCOPIA EN MATERIAL NO DETALLADO ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | BACILOSCOPIA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| BACILOSCOPIA I EN EXPECTORACIÓN ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | BACILOSCOPIA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 5 |
| BACILOSCOPIA I EN ORINA ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | BACILOSCOPIA EN ORINA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Las muestras de orina para baciloscopias deben mantenerse refrigeradas y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. | 5 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| BACILOSCOPIA II EN EXPECTORACIÓN ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | BACILOSCOPIA 2 | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 5 |
| BACILOSCOPIA II EN ORINA ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | BACILOSCOPIA2 EN ORINA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Las muestras de orina para baciloscopias deben mantenerse refrigeradas y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. | 5 |
| BACILOSCOPIA III EN EXPECTORACIÓN ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | BACILOSCOPIA 3 | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 5 |
| BACILOSCOPIA III EN ORINA ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | BACILOSCOPIA3 EN ORINA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Las muestras de orina para baciloscopias deben mantenerse refrigeradas y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. | 5 |
| BACTERIAS PANEL MOLECULAR | LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 1 |
| BACTERIOLÓGICO DE MATERIAL NO DETALLADO | A DEFINIR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 5 |
| BANDAS OLIGOCLONALES (MSP3) EN LCR Y SUERO | SUERO + LCR | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA + SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas + 1 mL LCR + 1ml SUERO, ambos refrigerados. | 20 |
| BARBITÚRICOS DETECCIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| BARTONELLA ESPECIES ADN / PCR (BARTB) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno de 8 horas. | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| Bartonella IG.G AC. ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO (Enf. Arañazo de gato) | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| Bartonella IG.G-M AC. ANTI (BART) DETERMINACIÓN EN SUERO (Enf. Arañazo de gato) | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| Bartonella IG.M AC. ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO (Enf. Arañazo de gato) | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 7 |
| BCR / ABL CUANTIFICACIÓN DE LA EXPRESIÓN EN LMC | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Enviar la muestra, TRES tubos EDTA con dato clínico, de lunes a viernes antes de las 16:00. | 20 |
| BCR / ABL ESTUDIO MOLECULAR DEL GEN | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Dos tubos EDTA. Enviar la muestra con dato clínico, de lunes a viernes antes de las 16:00. | 20 |
| BCR / ABL TRASLOCACIÓN 9;22 EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | Enviar la muestra con dato clínico, de lunes a viernes antes de las 16:00. | 7 |
| BCR / ABL TRASLOCACIÓN 9;22 EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Enviar la muestra con dato clínico, de lunes a viernes antes de las 16:00. | 7 |
| BENZODIACEPINAS DETECCIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| BENZODIAZEPINAS PANEL (9329SP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | | 14 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| BETA 2 GLICOPROTEÍNA1 IGG - IGM AC. ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 4 |
| BETA 2 MICROGLOBULINA (FB2MU) DETERMINACIÓN EN ORINA AISLADA | BETA 2 MICRO ORINA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | El paciente debe vaciar la vejiga tomar líquido (no menos de 0,5L) y juntar en la siguiente hora orina. Se necesitan 5 mL. | 8 |
| BETA 2 MICROGLOBULINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| BETA 2 TRANSFERRINA DETECCIÓN DE LCR EN OTRO FLUIDO (BETA2) | LIQUIDO DE PUNCIÓN | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| BETA CROSS LAP DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO IM | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno de 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y enviar al laboratorio a la brevedad. Si no fuera posible separar el suero y congelar. Enviar al laboratorio el suero congelado. | 7 |
| BETA GALACTOSIDASA (BGAW) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | La muestra debe ser enviadad al laboratorio el mismo día o al siguiente de la extracción, de lunes a jueves. | 18 |
| BETA GLUCOSIDASA LEUCOCITARIA (GBAW) DETERMINACION EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 15 |
| BHCG-GONADOTROFINA CORIONICA (BHSF) DETERMINACIÓN EN LCR | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Durante las 12 hs previas a la extracción no ingerir multivitaminas o suplementos dietéticos que contengan biotina (vitamina B7) que se encuentran comúnmente en suplementos de pelo, piel y uñas. | 7 |
| BHCG-GONADOTROFINA CORIONICA CUANTITATIVA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| BHCG-LIBRE TAMIZAJE DEL PRIMER TRIMESTRE DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 3 |
| BICARBONATO DETERMINACIÓN EN ORINA (FBIUR) MUESTRA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada. | 10 |
| BILIRRUBINAS TOTALES | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| BIOMARCADORES DE PRE ECLAMPSIA sFlt-1/PIGF DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | | 3 |
| BIOTINA VITAMINA B7 (FBIOT) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo de 8 horas. Proteger de la luz. | 20 |
| BIOTINIDASA (BIOTS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 15 |
| BK VIRUS (PBKQN) DETERMINACIÓN CUANTITATIVA EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | La muestra debe centrifugarse dentro de las 2 horas de la recolección y separar el plasma. Enviar al laboratorio el plasma refrigerado o congelado. | 8 |
| BK VIRUS DETERMINACIÓN CUANTITATIVA (QBKU) EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | La muestra debe ser congelada o enviada al laboratorio a la brevedad. Luego de congelada estable por 48 horas antes de llegar al laboratorio. | 7 |
| BLASTOMYCES (SBL) ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 8 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| BNP DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA CON EDTA | EDTA / TAPÓN LILA | | 7 |
| BORDETELLA PERTUSSIS (BORDG) AC.ANTI IGG DETERMIANCIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| Bordetella pertussis HISOPADO NASO FARÍNGEO / PCR DETERMINACIÓN | HISOPO NASO-FARINGEO | PANEL RESPIRATORIO | | 1 |
| BORRELIA AFZELII - GARINII (ELYME) ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 8 |
| BORRELIA BURGDORFERI AC.ANTI (LYME) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| BORRELIA BURGDORFERI ANTICUERPOS ANTI (CLYME) DETERMINACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 15 |
| BORRELIA BURGDORFERI ANTICUERPOS ANTI IGG-M CONFIRMATORIO (LYWB ) EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| BORRELIA BURGDORFERI ADN (PBORB) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 7 |
| BORRELIA BURGDORFERI ADN (PBORR) DETERMINACIÓN EN LCR | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| BORRELIA BURGDORFERI ANTICUERPOS ANTI IGG-M CONFIRMATORIO (LYWB ) EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 15 |
| BORRELIA ENF.LYME PCR (PBORR) DETERMINACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| BORRELIA LYME INFECCIÓN-SNC (LNBAB) DETERMINACIÓN AC.ANTI IGG EN LCR & SUERO | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| BRCA1-BRCA2 (BRCAZ) SECUENCIACIÓN TOTAL EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 28 |
| BRCA1-BRCA2 SECUENCIACIÓN TOTAL EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 40 |
| BROMUROS (ZW86-0720SP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | METAL FREE S/A | Ayuno mínimo de 8 horas. Recolectar la sangre en tubo especial para metales proporcionado por el laboratorio. Centrifugar la muestra luego de 30 minutos de la extracción. Dentro de las 4 horas siguientes a la recolección transferir el suero cuidadosamente sin usar pipeta a un tubo seco limpio y sin gel proporcionado por el laboratorio. | 15 |
| BROMUROS DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Al final de la jornada laboral. | 15 |
| BRUCELLA (BRUC) CULTIVO | LÍQUIDO DE PUNCIÓN | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 18 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| BRUCELLA ABORTUS CONFIRMACIÓN (BRUTA) AGLUTINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 10 |
| BRUCELLA ANTICUERPOS ANTI (BRCMG) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| BRUGADA SINDROME DE PANEL MULTI-GEN (BRGGP) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 84 |
| BUPROPION (FBUHB) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | HEPARINA | El plasma debe ser congelado o la muestra de sangre entera (Heparina) enviada al laboratorio a la brevedad. | 12 |
| BÚSQUEDA DE FILARIAS EN SANGRE PERIFÉRICA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | | 3 |
| C3 FACTOR NEFRÍTICO C3NEF (ZW210/86161) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | | 35 |
| C5 COMPLEMENTO FUNCIONAL (C5FX ) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y enviar al laboratorio a la brevedad manteniendo la cadena de frio. Si no fuera posible separar suero y congelar. Enviar al laboratorio el suero congelado. | 6 |
| C6 COMPLEMENTO FUNCIONAL (C6FX) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 6 |
| CA 15-3-ATC MONOCLONAL -MAMA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CA 19-9-ATC MONOCLONAL (199PT) DETERMINACIÓN EN LIQUIDO PERITONEAL | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 6 |
| CA 19-9-ATC MONOCLONAL DETERMINACIÓN EN LIQUIDO PANCREATICO | LIQUIDO PANCREATICO | A DEFINIR | | 15 |
| CA 19-9-ATC MONOCLONAL DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 7 |
| CA 27.29 ANTÍGENO CARBOHIDRATADO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Centrifugar la muestra antes de las 2 hs. post extracción. | 7 |
| CADASIL (GEN NOCH 3) FCCEV EVALUACIÓN COMPLETA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno de 4 horas. Extraer 3 tubos de EDTA. Mínimo 8 ml. | 55 |
| CADENAS LIVIANAS LIBRES (FLCP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| CADENAS LIVIANAS LIBRES INMUNOFIJACIÓN (FIFLC) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |
| CADMIO (CDB) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | METAL FREE EDTA | Ayuno mínimo de 8 horas. Recolectar la sangre en tubo especial para metales proporcionado por el laboratorio. | 6 |
| CADMIO (CDRC) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | METALES ORINA | Al final de la jornada laboral. | 8 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CAFEÍNA (CAFF) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 6 |
| CALCIO DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas | 3 |
| CALCIO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| CALCIO IONICO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| CALCITONINA (CATLN) ASPIRADO CON AGUJA FINA | LÍQUIDO DE PUNCIÓN | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 6 |
| CALCITONINA (CATN) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas.<br>Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) durante las doce horas previas a la extracción.<br>Centrifugar y separar antes de las 2 horas post extracción. Enviar la muestra al laboratorio el día de la extracción, manteniendo la cadena de frio. Si no fuera posible enviar la muestra congelada. | 7 |
| CÁLCULO DE GLÁNDULA SALIVAL | CALCULO GLÁNDULA SALIVAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| CÁLCULO DEL SACO LAGRIMAL | CALCULO LAGRIMAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CÁLCULO URINARIO (KIDST) ESTUDIO QUÍMICO | CALCULO URINARIO | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |
| CALPROTECTINA (CALPR) DETERMINACIÓN EN MATERIA FECAL | MATERIA FECAL | FRASCO / MATERIA FECAL | Recolección aleatoria de heces. Las muestras de heces sueltas o liquidas son aceptables.<br>Evitar el envío de muestras de heces de pañales, a menos pueda tomarse en una parte de las heces que no esté en contacto con el material del pañal.<br>Usar frasco limpio con tapa a rosca.<br>Mantener refrigerada entre 2 y 8 °C y enviar al laboratorio dentro de las 96 horas de su recolección.<br>Cuando esto no sea posible, congelar a -20 °C, deberá recibirse en el laboratorio congelada. | 15 |
| CALRETICULINA ANÁLISIS DE LA MUTACIÓN (CALR) EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Se requiere la siguiente información:<br>-Historia clínica pertinente.<br>-Sospecha clínica o morfológica.<br>-Fecha de la extracción. | 8 |
| CÁNCER COLORRECTAL PANEL DE NGS (MCCRC) EN MUESTRA TUMORAL | ANATOMÍA PATOLÓGICA | ANATOMÍA PATOLÓGICA | | 24 |
| CANCER DE COLON INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES & PANEL DE 9 GENES (MCCRC) DETERMINACIÓN EN TEJIDO | ANATOMÍA PATOLÓGICA | ANATOMÍA PATOLÓGICA | | 25 |
| CANCER HEREDITARIO (XCP) PANEL EXPANDIDO 87 GENES EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 31 |
| CARBAMAZEPINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Realizar toma antes de ingerir medicamento. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CARBAPENEMASAS (CULTIVO) EN HISOPO RECTAL | A DEFINIR | HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE | Realizar la toma intrarectal a 1 cm del esfínter anal evitando exceso de materia fecal. Transporte refrigerado. | 5 |
| CARBAPENEMASAS (PCR) DETERMINACIÓN EN HISOPO RECTAL | CARB PCR Hisopo Rectal | CARB PCR | Solicitar al laboratorio LAC hisopos dobles con medio de transporte específico para PCR. Realizar la toma intrarectal a 1 cm del esfínter anal evitando exceso de materia fecal. Transporte refrigerado. | 1 |
| CARBOXI HEMOGLOBINA VENOSA | SANGRE TOTAL | JERINGA HEPARINA | | 1 |
| CARDIOLIPINAS ANTICUERPOS ANTI IGG - IGM DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 4 |
| CARDIOMIOPATÍAS PANEL GENÉTICO (CCMGG) INVESTIGACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 45 |
| CARNÉ DE SALUD COMPLETO (NUEVO) | PLASMA FLUORURO +SUERO + ORINA FRESCA | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |
| CARNÉ DE SALUD EXTENDIDO | PLASMA FLUORURO +SUERO + ORINA FRESCA | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |
| CARNÉ DE SALUD EXTENDIDO CON HEMOGRAMA | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO + SUERO + ORINA FRESCA | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |
| CARNE DE SALUD PROF | PLASMA FLUORURO + SUERO + ORINA FRESCA | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CARNÉ DE SALUD SIMPLE | PLASMA FLUORURO + SUERO + ORINA FRESCA | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |
| CARNÉ DE SALUD SIN ORINA | PLASMA FLUORURO + SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |
| CARNITINA L (PERFIL) CARN DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| CARNITINA LIBRE Y TOTAL (CARNU) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada. | 12 |
| CARNITINA PERFIL (CARNS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 6 |
| CAROTENO BETA (FCARO) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo de 12 horas. No beber alcohol en las 24 horas previas a la extracción. Proteger de la luz. | 15 |
| CATECOLAMINAS (CATP) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA HEPARINA | HEPARINA | Ayuno mínimo 8 horas. Ver manual de Instrucciones para dar indicaciones al paciente. Mantener refrigerados los tubos al momento de su utilización. Luego de realizar la toma de la muestra mantener en cadena de frio y enviar al laboratorio dentro de la hora siguiente de la recolección. Si no fuera posible, centrifugar la muestra, separar el plasma y enviar el plasma dentro de las 24 hs. siguientes a la extracción en cadena de frio. Si esto no fuera posible, luego de centrifugar la muestra, congelar y enviar al laboratorio manteniendo la cadena de frio. | 15 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CATECOLAMINAS (CATU) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones. | 7 |
| CATETER CULTIVO PUNTA DE ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | A DEFINIR | HISOPO SIN MEDIO DE TRANSPORTE | | 5 |
| CBFB ESTUDIO DEL REORDENAMIENTO DEL GEN POR FISH EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | | 30 |
| CD 20 DETERMINACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 15 |
| CD20 EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN (CEE20) EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 7 |
| CEBPA MUTACIÓN ALFA (CEBPA) SECUENCIACIÓN DEL GEN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 11 |
| CÉLULA PARIETAL GÁSTRICA AC.ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| CÉLULAS BETA PANCREÁTICAS AC..ANTI(IA-2) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| CENTRÓMERO ANTICUERPOS ANTI (CENP-B) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CENTRÓMERO ANTICUERPOS ANTI IGG (CMA) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 8 |
| CERAMIDAS (CERAM) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 12 |
| CERAMIDE TRIHEXOSIDA Y SULFATIDOS (CTSA) DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Primera orina de la mañana. | 17 |
| CERULOPLASMINA (CERE) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| CHAGAS - IFI - ANTICUERPOS ANTI T. CRUZI | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| CHAGAS ANTICUERPO ANTI TRYPANOSOMA CRUZI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno de 8 horas. | 3 |
| CHAGAS Trypanosoma cruzi DETECCIÓN EN SANGRE PERIFÉRICA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | | 3 |
| CHEQUEO CS | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO + SUERO + ORINA FRESCA | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |
| CHEQUEO GENERAL | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO + SUERO + ORINA FRESCA | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CHEQUEO MEDICO | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO + SUERO + ORINA FRESCA | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |
| CHEQUEO Personalizado | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO + SUERO + ORINA FRESCA | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |
| CHIKUNGUNYA ANTICUERPOS ANTI (FCART) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 12 |
| CHIKUNGUNYA VIRUS DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 10 |
| CHLAM.TRACHOM./NEISSERIA GONORRHOEAE PCR DETERMINACIÓN EN EX.VAGINAL | VAGINAL PCR | VAGINAL CON MEDIO PCR | | 3 |
| CHLAM.TRACHOMATIS/NEISSERIA GONORRHOEAE-MYCOPLASMA GENITALIUM/TRICH.VAG. PCR DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones. El paciente debe recolectar la primera porción de orina evacuada al azar (primera parte del chorro) en un recipiente estéril, sin conservantes. La muestra debe enviarse al laboratorio a temperatura ambiente dentro de las 48 horas de su recolección. Si esto no fuera posible, la muestra se deberá congelar y llegar al laboratorio congelada. | 3 |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE AC.ANTI CONFIRMATORIO (CHLAP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE AC.ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CHLAMYDIA PSITACCI ANTICUERPOS ANTI (CHLAP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS AC.ANTI (SCLAM) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS ADN DETERMINACIÓN EXUDADO CONJ.DER. | EX. CONJ. DERECHO PCR | HISOPO SIN MEDIO DE TRANSPORTE | | 10 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS ADN DETERMINACIÓN EXUDADO CONJ.IZQ. | EX. CONJ. IZQUIERDO PCR | HISOPO SIN MEDIO DE TRANSPORTE | | 10 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTÍGENO DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 5 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS PCR DETERMINACIÓN EN CÓRNEA | CÓRNEA PCR | CÓRNEA SUERO FISIOLÓGICO | | 3 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS PCR DETERMINACIÓN EN EXUDADO FARÍNGEO | UTM FARÍNGEO | Medio de Transporte UTM | | 1 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS PCR DETERMINACIÓN EN EXUDADO VAGINAL | VAGINAL PCR | VAGINAL CON MEDIO PCR | | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS PCR DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA PCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | El paciente debe recolectar la primera porción de orina evacuada al azar (primera parte del chorro) en un recipiente estéril, sin conservantes. La muestra debe enviarse al laboratorio a temperatura ambiente dentro de las 48 horas de su recolección. Si esto no fuera posible, la muestra se deberá congelar y llegar al laboratorio congelada. | 3 |
| CIANURO (FCYAN) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | FLUORURO / TAPÓN GRIS | | 13 |
| CICLOSPORINA EN DOS TIEMPOS (2 hs) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| CICLOSPORINA POST DOSIS DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL (Ciclosporina post dosis) | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| CICLOSPORINA PRE DOSIS DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| CISTATINA C CON ESTIMACIÓN DEL FGR (CYSTC) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 5 |
| CISTICERCOSIS ANTICUERPOS ANTI (CYST) DETERMINACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 12 |
| CISTICERCOSIS ANTICUERPOS ANTI IGG (CYSTS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 5 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CISTINA PERFIL (CYSQN) DETERMINACIÓN EN ORINA 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas. | 9 |
| CISTINA PERFIL (CYSR) DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada. | 9 |
| CITOGENETICO MEDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | Enviar dato clínico. | 35 |
| CITOLOGÍA | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 4 |
| CITOLOGÍA CLÍNICA | Citología Clínica | A definir | | 7 |
| CITOLOGÍA DE EXPECTORACIÓN | EXPECTORACIÓN | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| CITOLOGÍA DE EXUDADO NASAL | EXUDADO NASAL | HISOPO SIN MEDIO DE TRANSPORTE | | 7 |
| CITOLOGÍA EN LIQUIDO PANCREÁTICO | LIQUIDO PANCREÁTICO | A definir | | 7 |
| CITOLOGÍA URINARIA | ORINA RECIÉN EMITIDA | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CITOMEGALOVIRUS AC.ANTI Ig.G DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| CITOMEGALOVIRUS AC.ANTI Ig.G-M DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| CITOMEGALOVIRUS AC.ANTI Ig.M DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| CITOMEGALOVIRUS ADN VIRAL (CMVQU) CUANTIFICACIÓN EN PLASMA | PLASMA EDTA | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| CITOMEGALOVIRUS ADN VIRAL CUANTIFICACIÓN EN LAVADO BRONQUIO ALVEOLAR | LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| CITOMEGALOVIRUS ADN VIRAL CUANTIFICACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 1 |
| CITOMEGALOVIRUS ADN VIRAL CUANTIFICACIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | La muestra deber enviarse al laboratorio a temperatura ambiente dentro de las 4 horas de su recolección. Si esto no fuera posible, la muestra se deberá congelar y llegar al laboratorio congelada. | 7 |
| CITOMEGALOVIRUS ADN VIRAL (LCMV) INVESTIGACIÓN EN BIOPSIA | AP | AP | | 7 |
| CITOMEGALOVIRUS DETERMINACIÓN EN LCR | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | La muestra deber enviarse al laboratorio refrigerada dentro de las 4 horas de su recolección. Si esto no fuera posible, la muestra se deberá congelar y llegar al laboratorio congelada. | 1 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CITOMEGALOVIRUS-EPSTEIN BARR VIRUS-ADENOVIRUS PCR DETERMINACIÓN EN CÓRNEA | CÓRNEA PCR | CÓRNEA SUERO FISIOLÓGICO | | 3 |
| CITOMEGALOVIRUS ÍNDICE DE AVIDEZ DE AC. ANTI IGG (FCYTG) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 12 |
| CITOMEGALOVIRUS PCR DETERMINACIÓN EN SANGRE PAPEL DE FILTRO | PUNCIÓN DE TALÓN | PAPEL DE FILTRO | | 5 |
| CITOMEGALOVIRUS PCR (LCMV) DETECCIÓN EN BIOPSIA | ANATOMÍA PATOLÓGICA | ANATOMÍA PATOLÓGICA | | 7 |
| CITOMEGALOVIRUS PCR (LCMV) DETECCIÓN EN LÍQUIDO PLEURAL | LÍQUIDO PLEURAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| CITOMEGALOVIRUS PCR (LCMV) EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | EDTA / TAPÓN LILA | | 7 |
| CITOSOL HEPÁTICO ANTICUERPOS ANTI (ZW96/90535) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 12 |
| CITRATO (CITR) DETERMINACIÓN EN ORINA (CITRATURIA) 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas. Refrigerar la orina durante toda la recolección. Se puede solicitar en muestra aislada en niños cuando no sea posible la recolección de 24 horas. | 8 |
| CITRULINA AMINO.AC.CICLO DE LA UREA (AAUCD) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA CONGELADO | EDTA / TAPÓN LILA | | 15 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CLOBAZAM (CLOBZ) (DESMETHYLCLOBAZAM) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | | 10 |
| CLONAZEPAM DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | Se requiere suero 1.5 mL. Centrifugar y separar antes de las 2 hs. post extracción. Enviar refrigerado. Ayuno mínimo 8 horas. | 6 |
| CLONIDINA (FCLON) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | | 7 |
| CLORO DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas. | 3 |
| CLORO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| CLORPROMAZINA (FCHPZ) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 11 |
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE DETERMINACIÓN DE GDH-TOXINAS A/B EN MATERIA FECAL | MATERIA FECAL | FRASCO / MATERIA FECAL | Muestra aislada. | 1 |
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINAS INVESTIGACIÓN POR PCR | MATERIA FECAL | FRASCO / MATERIA FECAL | Muestra aislada | 1 |
| CLOZAPINA (CLZ) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Realizar toma antes de ingerir medicamento. | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CMR VALORACIÓN GENERAL | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO + SUERO + ORINA FRESCA | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |
| CMR VALORACIÓN GENERAL CON PSA | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO + SUERO + ORINA FRESCA | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |
| COAGULACIÓN TIEMPO DE | SANGRE ENTERA EN TUBO SECO | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA / SUERO | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 3 |
| COBALTO (CORU) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Al final de la jornada laboral. | 11 |
| COBALTO (COS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | TUBO SECO METALES | Ayuno mínimo de 8 horas. Recolectar la sangre en tubo especial para metales proporcionado por el laboratorio. Centrifugar la muestra luego de 30 minutos de la extracción y transferir el suero cuidadosamente sin usar pipeta a un tubo seco limpio y sin gel proporcionado por el laboratorio. | 9 |
| COBRE (CURCU) DETERMINACIÓN EN MUESTRA AISLADA DE ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 9 |
| COBRE (CUS1) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | TUBO SECO METALES | Ayuno mínimo de 8 horas. Recolectar la sangre en tubo especial para metales proporcionado por el laboratorio. Centrifugar la muestra luego de 30 minutos de la extracción y transferir el suero cuidadosamente sin usar pipeta a un tubo seco limpio y sin gel proporcionado por el laboratorio. | 6 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| COBRE (CUU) DETERMINACIÓN EN ORINA DE 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas. | 10 |
| COBRE (FCOPP) DETERMINACIÓN EN GLÓBULOS ROJOS | EDTA METAL FREE | EDTA METAL FREE | Ayuno mínimo de 8 horas. Recolectar la sangre en tubo especial para metales proporcionado por el laboratorio. Centrifugar y separar el plasma dentro de las 2 horas siguientes a la extracción. Dejar los glóbulos rojos en el tubo original y sustituya el tapón. Envíe los glóbulos rojos de 1 mL refrigerados. | 15 |
| COCAÍNA (FCOKE) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 12 |
| COCAÍNA DETECCIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| COCCIDIOIDES ANTICUERPOS ANTI (SCOC) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 12 |
| COCLEARES AC.ANTI 68kD (hsp-70) F68KD DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| COENZIMA Q10 TOTAL (TQ10) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE ENTERA (HEPARINA) | HEPARINA | Ayuno de 8 horas. Realizar la extracción y enviar al laboratorio el tubo con hielo. En caso de trasladar la muestra, luego de la extracción enfriar la sangre entera en hielo durante al menos 10 minutos, luego centrifugar, separar y enviar el plasma congelado. | 11 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| COFACTOR DE RISTOCETINA DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |
| COLESTANOL (FCHO) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 12 |
| COLESTANOL (STER) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 12 |
| COLESTEROL TOTAL - HDL DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |
| COLESTEROL TOTAL DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |
| COLINESTERASA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| COMPLEJOS INMUNES CIRCULANTES (CIC) | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 21 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO C1 Inhibidor esterasa Actividad (FC1EQ) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. Poner la muestra en hielo inmediatamente luego de la extracción y enviarla al laboratorio. En caso de ser necesario, centrifugar, separar y congelar antes de los 30 mín. post extracción. | 9 |
| COMPLEMENTO C1 INHIBIDOR ESTERASA (C1ES) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo de 8 horas. Inmediatamente después de la recolección, coloque el tubo en hielo húmedo. Centrifugar y separar el suero. Enviar al laboratorio el suero dentro de los 30 minutos siguientes, manteniendo la cadena de frio. Si esto no fuera posible, congelar la muestra (plasma). Asegurarse de que llegue al laboratorio congelada. Volumen requerido: 1 mL. | 6 |
| COMPLEMENTO C1q (C1Q) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 12 horas. Enviar refrigerado. | 7 |
| COMPLEMENTO C1q PRUEBA FUNCIONAL (C1QFX) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y enviar al laboratorio a la brevedad manteniendo la cadena de frio. Si no fuera posible separar suero y congelar. Enviar al laboratorio el suero congelado. | 7 |
| COMPLEMENTO C8 FUNCIONAL (C8FX) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| COMPLEMENTO C9 FUNCIONAL (C9FX) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO CH50 (COM) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO derivación | Ayuno mínimo de 8 horas. Imediatamente después de la recolección, coloque el tubo en hielo húmedo. Centrigugar y separar el suero. Enviar al laboatorio el suero dentro de los 30 minutos siguientes, manteniendo la cadena de frio. Si esto no fuera posible, congelar la muestra (plasma). Asegurarse de que llegue al laboratorio congelada. Volumen requerido: 1 mL. Contenedor: Tubo seco sin gel. | 7 |
| COMPLEMENTO FRACCIÓN C2 (C2) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. Colocar la muestra en hielo inmediatamente luego de la extracción y enviarla al laboratorio. Si esto no es posible, centrifugar, separar suero y congelar. Enviar al laboratorio congelado. | 10 |
| COMPLEMENTO FRACCIÓN C2 ANTÍGENO (C2AG) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y enviar al laboratorio a la brevedad manteniendo la cadena de frio. Si no fuera posible separar suero y congelar. Enviar al laboratorio el suero congelado. | 20 |
| COMPLEMENTO SÉRICO (C3) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| COMPLEMENTO SÉRICO (C4) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| COMPLEMENTO SÉRICO C3-C4 DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| COMPLEMENTO VÍA ALTERNA (AH50) FUNCIONAL DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| COOMBS DIRECTO | SANGRE EDTA GRUPOS | EDTA / TAPÓN LILA | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| COOMBS DIRECTO E INDIRECTO | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| COOMBS INDIRECTO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| COPEPTINA PRO VASOPRESINA (CPAVP) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | Ayuno de 8 horas. | 7 |
| COPROCULTIVO ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | MATERIA FECAL | FRASCO / MATERIA FECAL | | 5 |
| COPROFUNCIONAL | MATERIA FECAL | FRASCO TAPA AZUL / WEBER | Ver Manual de Instrucciones. | 7 |
| COPROPARASITARIO | MATERIA FECAL | FRASCO / MATERIA FECAL | Ver Manual de Instrucciones. | 3 |
| COPROPORFIRINAS (PQNU) DETERMINACIÓN EN ORINA 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Proteger de la luz.Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas. | 8 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CORTISOL BASAL DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Realizar la extracción a en condiciones basales (reposo nocturno, no ejercicio físico previo a la toma de muestra). Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| CORTISOL BASAL TOTAL Y LIBRE (CORTO) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | | 10 |
| CORTISOL CURVA BASAL Y VESPERTINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Realizar la extracción en condiciones basales (reposo nocturno, no ejercicio físico previo a la toma de muestra) a las 8:00 AM. La toma vespertina debe realizarse luego de la actividad física normal habitual para el paciente, en un rango horario: 18.00-20.00 horas. Se debe especificar la hora de toma de la muestra. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| CORTISOL LIBRE DETERMINACIÓN EN ORINA DE 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas | 9 |
| CORTISOL MATINAL (SALCT) DETERMINACIÓN EN SALIVA | SALIVA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Hora 7 a 9 AM (verificar hora y anotar en frasco). Ver Manual de Instrucciones | 7 |
| CORTISOL POST DEXAMETASONA 1mg | SUERO DEXAM 1 mg | SUERO DEXAM 1 mg | | 3 |
| CORTISOL POST DEXAMETASONA 8 mg | SUERO DEXAM 8 mg | SUERO DEXAM 8 mg | | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CORTISOL POST DEXAMETASONA 20 mg | SUERO DEXAM 20 mg | SUERO DEXAM 20 mg | | 3 |
| CORTISOL VESPERTINO (SALCT) DETERMINACIÓN EN SALIVA | SALIVA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Hora 22 PM (verificar hora y anotar en frasco). | 7 |
| CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE AC. ANTI (DIPGS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| COS VIRUS RESPIRATORIOS (Influenza A/B - RSV - Adenovirus - SARS-CoV-2) INVESTIGACIÓN | Nasofaríngea | Medio de Transporte UTM | | 1 |
| COTININA DETECCIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| COVID-19 LAC SARS-CoV-2 CORONAVIRUS DETERMINACIÓN EN SECRECIÓN RESPIRATORIA | Nasofaríngea | Medio de Transporte UTM | | 1,5 (36 horas) |
| COVID-19 MSP SARS-CoV-2 CORONAVIRUS EN SECRECIÓN RESPIRATORIA | FAUCES | Aspirado NF / Ex. Nasal | | 3 |
| COVID-19 REF. SARS-CoV-2 CORONAVIRUS DETERMINACIÓN EN SECRECIÓN RESPIRATORIA | FAUCES | Aspirado NF / Ex. Nasal | | 3 |
| CRASIS ESTUDIO SIMPLE | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE | Ayuno mínimo de 2 horas. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CRASIS SANGUÍNEA CON RECUENTO PLAQUETARIO | SANGRE TOTAL + PLASMA CITRATADO | EDTA / TAPÓN LILA + CITRATO / TAPÓN CELESTE | Ayuno mínimo de 2 horas | 3 |
| CREATINA DEFICIT (CRDPU) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 21 |
| CREATINFOSFOKINASA FRACCIONES (CKELR) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Centrifugar la muestra antes de las 2 hs de la recolección. | 9 |
| CREATINFOSFOQUINASA (CPK) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| CREATINFOSFOQUINASA FRACCIÓN MB DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| CREATININA (MA) | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |
| CREATININA CLEARENCE DE RUTINA | SUERO + ORINA 24 HS | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO + FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones. | 3 |
| CREATININA DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas | 3 |
| CREATININA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CREATININA EN MUESTRA DE ORINA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada | 3 |
| CRECIMIENTO HORMONA DEL (HGH) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 6 |
| CRECIMIENTO HORMONA DEL 5 TIEMPOS (HGH) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 6 |
| CRECIMIENTO HORMONA DEL POST EJER. DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 6 |
| CRIOAGLUTININAS DETERMINACIÓN | SANGRE TOTAL | 2 TUBOS EDTA / TAPÓN LILA | Coordinar con el LAC. Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| CRIOFIBRINÓGENO DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA CITRATADO | CITRATO / TAPÓN CELESTE | Ayuno mínimo 8 horas. Coordinar con el LAC. | 10 |
| CRIOGLOBULINAS | PLASMA CITRATADO + SUERO | CITRATO / TAPÓN CELESTE / SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | Ayuno mínimo 8 horas. Coordinar con el LAC de lunes a jueves. | 10 |
| CRIOPRECIPITINAS DETERMINACIÓN | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | Ayuno mínimo 8 horas. | 20 |
| CRISTALES IDENTIFICACIÓN EN LÍQUIDO SINOVIAL (SFC) | Cristales Liq.sinovial | EDTA / TAPÓN LILA | | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CRMP-5 IGG / CV2 AC.ANTI | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo de 8 horas. Si se envía suero enviar 4 mL. | 20 |
| CROMO (CR) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 8 |
| CROMO (CRS ) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | TUBO SECO METALES | Ayuno mínimo de 8 horas. Recolectar la sangre en tubo especial para metales proporcionado por el laboratorio. Centrifugar la muestra luego de 30 minutos de la extracción y transferir el suero cuidadosamente sin usar pipeta a un tubo seco limpio y sin gel proporcionado por el laboratorio. | 15 |
| CROMOGRANINA A (CGAK) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Se recomienda suspender, previa consulta con médico tratante, durante por lo menos dos semanas antes de la extracción, los fármacos pertenecientes al grupo de Inhibidores de la bomba de protones. | 7 |
| CRYPTOCOCO BÚSQUEDA DE ANTÍGENOS (CLFA) EN LCR | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| CRYPTOCOCO BÚSQUEDA DE ANTÍGENOS (PLFA) EN LIQUIDO PLEURAL | LÍQUIDO PLEURAL | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 5 |
| CRYPTOCOCO BÚSQUEDA DE ANTÍGENOS (SLFAT) EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| CSF3R EXON 14 & 17 MUTACIONES SEC.SANGER (CSF3R) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 12 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CSST | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 1 |
| CUERPOS CETÓNICOS DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada | 3 |
| CUERPOS CETÓNICOS DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| CUERPOS REDUCTORES EN MATERIA FECAL | MATERIA FECAL | FRASCO / MATERIA FECAL | Muestra aislada | 14 |
| CUERPOS REDUCTORES EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada | 14 |
| CULTIVO BK DE LIQUIDO PLEURAL CHLA ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | LIQUIDO PLEURAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Enviar datos del domicilio y teléfono del paciente. Coordinar con el laboratorio. | 60 |
| CULTIVO BK EXPECTORACIÓN ESTUDIO BACTERIOLÓGICO CHLA | EXPECTORACIÓN | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Enviar datos del domicilio y teléfono del paciente. Coordinar con el laboratorio. | 70 |
| CULTIVO BK LAVADO BR-ALV ESTUDIO BACTERIOLÓGICO CHLA | LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Enviar datos del domicilio y teléfono del paciente. Coordinar con el laboratorio. | 45 |
| CULTIVO BK MATERIAL NO DETALLADO ESTUDIO BACTERIOLÓGICO CHLA | BK MAT NO DETALLADO CHLA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Es necesario llenar el formulario del MSP. Enviar datos del domicilio y teléfono del paciente. Coordinar con el laboratorio. | 45 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| CULTIVO DE LCR CHLA ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Enviar datos del domicilio y teléfono del paciente. Coordinar con el laboratorio. | 70 |
| CULTIVO PARASITOLOGÍA / MICOLOGÍA | A DEFINIR | HISOPO SIN MEDIO DE TRANSPORTE | | 30 |
| CV2 ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| CYFRA 21.1 ANTÍGENO (ZW242-57378) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| D Dímero DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA CITRATADO | CITRATO / TAPÓN CELESTE | | 3 |
| DARATUMUMAB INMUNOFIJACIÓN ESPECÍFICA (ZW131/94514) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 14 |
| DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA_) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | | 13 |
| DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 11 |
| DEHIDROGENASA LÁCTICA (LDH) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| DEHIDROGENASA LÁCTICA ISOENZIMAS (LD_I) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 8 |
| DELECIÓN (11q22) gen ATM DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE ENTERA HEPARINIZADA | HEPARINA | | 3 |
| DELECIÓN (13q14.3) DETERMINACIÓN EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | Enviar dato clínico. | 3 |
| DELECIÓN (13q14.3) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE ENTERA HEPARINIZADA | HEPARINA | | 3 |
| DELECIÓN 11q22 INVESTIGACIÓN EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | Enviar dato clínico. | 20 |
| DELECIÓN 17p13.1 INVESTIGACIÓN EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | Enviar dato clínico. | 20 |
| DEMODEX BÚSQUEDA EN PESTAÑAS | 4 PESTAÑAS | TUBO ESTÉRIL | | 3 |
| DENGUE ANTICUERPOS ANTI IGG-M DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno de 8 horas. | 3 |
| DENGUE ANTÍGENO (NS1) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno de 8 horas. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| DENGUE II SEGUIMIENTO (MSP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| DENGUE-ZICA-CHIKUNGUNYA AC.ANTI IGG-IGM DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno de 8 horas. | 3 |
| DENGUE-ZICA-CHIKUNGUNYA MULTIPLEX PCR DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno de 8 horas. | 5 |
| DEOXIPIRIDINOLINA (PIRILINKS) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA PIRILINK | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Orina sin conservante, primera o segunda micción de la mañana antes de 10.00 AM. | 3 |
| DESMOGLEÍNA 1-3 ANTICUERPOS ANTI (DSGAB) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 14 |
| DESPISTAJE DE SUSTANCIAS (FNR) | ORINA FRESCA | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 1 |
| DEXTOMETRORFANO (FDM) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | | 14 |
| DFS70 ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO | | 3 |
| DIFENILHIDANTOINA - FENITOÍNA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas / realizar toma antes de ingerir medicamento. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| DIGOXINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas / realizar toma antes de ingerir medicamento. | 3 |
| DIHIDROPIRIMIDINA DESHIDROGENASA (DPYDG) SECUENCIACIÓN DEL GEN COMPLETO DPYD EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 14 |
| DIHIDROPIRIMIDINA DESHIDROGENASA (DPYDQ) GENOTIPO EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 14 |
| DIHIDROTESTOSTERONA (DHTS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| DIMERO D DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA CITRATO | CITRATO / TAPÓN CELESTE | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| DNA ANTICUERPOS ANTI (Crithidia luciliae) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| DNASA ANTICUERPOS (ADNAS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| DPG AC. ANTI IGA | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| DPG AC. ANTI IGG | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| DROGAS DE ABUSO SCREENINIG EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| ECA ENZIMA CONVERT. ANGIOTENSINA (ACE) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| ECA ENZIMA CONVERT. ANGIOTENSINA (FACEC) DETERMINACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |
| ECHOVIRUS ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 12 |
| EHLERS-DANLOS SINDROME PANEL (46 GENES) NGS & DELECIONES/DUPLICACIONES (ZW179/NGS377) EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 34 |
| EHRLICHIA CHAFFEENSIS (EHRC) ANTICUERPOS ANTI IGG DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 8 |
| ELASTASA PANCREÁTICA (ELASF) DETERMINACIÓN EN MATERIA FECAL | MATERIA FECAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada. | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ELECTROLITOS Y OSMOLARIDAD (EFPO) DETERMINACIÓN EN MATERIA FECAL | MATERIA FECAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | La muestra de Materia Fecal debe ser líquida. | 7 |
| ELEMENTOS FORMES EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Primera orina de la mañana | 3 |
| EMBARAZO CONTROL DEL TRIM. I | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO + SUERO + ORINA FRESCA + UROCULTIVO | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA ESTÉRIL | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| EMBARAZO CONTROL DEL TRIM. I SIN ORINA | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO + SUERO + ORINA FRESCA + UROCULTIVO | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA ESTÉRIL | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| EMBARAZO CONTROL DEL TRIM. II | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO + SUERO + ORINA FRESCA + UROCULTIVO | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA ESTÉRIL | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| EMBARAZO CONTROL DEL TRIM. II SIN ORINA | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO + SUERO | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| EMBARAZO CONTROL DEL TRIM. III | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO + SUERO + ORINA FRESCA + UROCULTIVO | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA ESTÉRIL | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| EMBARAZO CONTROL TRIMESTRE III SIN ORINA | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO + SUERO | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| EMBARAZO COSEM TRIMESTRE I | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO + SUERO + ORINA FRESCA | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA ESTÉRIL | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| EMBARAZO COSEM TRIMESTRE II | PLASMA FLUORURO + SUERO + ORINA FRESCA + UROCULTIVO | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA ESTÉRIL | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| EMBARAZO COSEM TRIMESTRE III | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO +SUERO + ORINA FRESCA | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA ESTÉRIL | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| ENCEFALOPATÍA AUTOINMUNE (ENC2) EVALAUCIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 14 |
| ENCEFALOPATÍA AUTOINMUNE (ENS2) EVALAUCIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 14 |
| ENCEFALOPATÍA AUTOINMUNE HASTA LOS 18 AÑOS (PCDEC) EVALUACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 14 |
| ENDOMISIO ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| ENDOMISIO IGG ANTICUERPOS ANTI (EMAIG) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 20 |
| ENFERMEDAD CELÍACA GENES VINCULADOS DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 10 |
| ENFERMEDAD CELÍACA GENES VINCULADOS MUCOSA YUGAL | MUCOSA YUGAL | HISOPO MUCOSA YUGAL | Dejar secar 15 minutos y guardar en el sobre. Mantener a temperatura ambiente. | 12 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ENOLASA NEURONAL ESPECÍFICA (NSE) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 6 |
| ENOLASA NEURONAL ESPECÍFICA (NSESF) DETERMINACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| ENTAMOEBA HISTOLYTICA AC ANTI IGG (EHOLG) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 9 |
| ENTAMOEBA HISTOLYTICA ANTÍGENOS (FECHA) DETERMINACIÓN EN MATERIA FECAL | MATERIA FECAL | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada. | 10 |
| ENTEROCITOS ANTICUERPOS GAM (FAEAB) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 60 |
| ENTEROVIRUS PCR (LENT) DETECCIÓN EN L.AMNIÓTICO | LÍQUIDO AMNIÓTICO | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| ENTEROVIRUS PCR (LENT) DETECCIÓN EN LÍQUIDO PLEURAL | LÍQUIDO PLEURAL | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| ENTEROVIRUS ARN DETERMINACIÓN POR PCR EN LCR | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| ENTEROVIRUS ARN DETERMINACIÓN POR PCR EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ENZIMOGRAMA CARDÍACO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| ENZIMOGRAMA HEPÁTICO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| ENZIMOGRAMA MUSCULAR DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Ver Manual de Instrucciones. | 3 |
| EOSINOFILIA EN EXUDADO NASAL | EXUDADO NASAL | HISOPO SIN MEDIO DE TRANSPORTE | | 7 |
| EOSINOFILIA PERSISTENTE FISH(EOSDF) DETERMINACIÓN EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | EDTA / TAPÓN LILA | | 15 |
| EOSINÓFILOS EN SANGRE PERIFÉRICA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Sin ayuno. | 3 |
| EPILEPSIA AUTOINMUNE (EPIEC) EVALUACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 13 |
| EPILEPSIA AUTOINMUNE (EPIES) EVALUACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 14 |
| EPSTEIN BARR AC. ANTI VCA IGG DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| EPSTEIN BARR AC. ANTI VCA IGM DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| EPSTEIN BARR AC. EBNA (SEBV) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 9 |
| EPSTEIN BARR ADN CUALITATIVO DETERMINACIÓN EN LCR | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| EPSTEIN BARR VIRUS (LEBV) DETECCIÓN MOLECULAR EN ORINA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 8 |
| EPSTEIN BARR VIRUS DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN (EBVQU) EN PLASMA | PLASMA EDTA | EDTA / TAPÓN LILA | | 6 |
| EPSTEIN BARR VIRUS DNA (LEBV) DETECCIÓN MOLECULAR EN LAVADO ALVEOLAR | LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| EPSTEIN BARR VIRUS DNA (LEBV) PCR DETECCIÓN EN LÍQUIDO AMNIÓTICO | LÍQUIDO AMNIÓTICO | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| ERITROPOYETINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| ESCITALOPRAM (CITAL) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ESCLERODERMIA PANEL (FMMPP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 18 |
| ESPÁTULA ADHESIVA INVESTIGACIÓN DE OXIUROS | A DEFINIR | ESPÁTULA | Ver Manual de Instrucciones. | 3 |
| ESPERMATICOS ANTICUERPOS ANTI (19492X) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 12 |
| ESPERMATOZOIDES EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Primera orina de la mañana | 3 |
| ESPERMOCULTIVO BÚSQUEDA DE GONOCOCO ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | ESPERMA GONOCOCO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 5 |
| ESPERMOCULTIVO ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | ESPERMA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 5 |
| ESQUISTOSOMA (BILHARIAZIS) BÚSQUEDA DE HUEVOS EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada | 3 |
| ESQUISTOSOMA AC.ANTI IGG (FSCHS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 11 |
| ESTEATOCRITO | MATERIA FECAL | FRASCO TAPA AZUL / WEBER | TOTAL del volumen de materia correspondiente a una deposición. Ver Manual de Instrucciones. | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ESTEROIDES ANABÓLICOS (ZW86-9306U) TAMIZAJE EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 16 |
| ESTIRENO (FSTYR) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE ENTERA HEPARINIZADA | HEPARINA | Enviar refrigerado dos tubos de sangre heparinizada. | 14 |
| ESTRADIOL DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| ESTRIOL DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 20 |
| ESTRADIOL LC-MS-MS (EEST) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 11 |
| ESTRONA E1 DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | Ayuno mínimo 8 horas. Centrifugar y separar antes de las 2 hs. post extracción | 8 |
| ESTUDIO CITOGENETICO CONSTITUCIONAL EN SANGRE PERIFÉRICA | SANGRE ENTERA HEPARINIZADA | JERINGA HEPARINA | Ayuno mínimo 8 horas. Enviar dato clínico, médico solicitante y teléfono de contacto. | 35 |
| ESTUDIO CITOGENETICO EN GANGLIO | TEJIDO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 26 |
| ESTUDIO CITOGENETICO EN LIQUIDO PLEURAL | LÍQUIDO PLEURAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 5 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO CITOGENÉTICO EN PUNCIÓN RENAL | LÍQUIDO EN PUNCIÓN | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |
| ESTUDIO CITOGENETICO HEMATOLÓGICO EN MEDULA OSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | | 35 |
| ESTUDIO CITOGENÉTICO HEMATOLÓGICO EN SANGRE PERIFÉRICA | SANGRE ENTERA HEPARINIZADA | JERINGA HEPARINA | | 15 |
| ESTUDIO CITOGENÉTICO MATERIAL DE LEGRADO | ANATOMÍA PATOLÓGICA | ANATOMÍA PATOLÓGICA | | 10 |
| ESTUDIO CITOGENÉTICO ÓBITO FETAL | ANATOMÍA PATOLÓGICA | ANATOMÍA PATOLÓGICA | | 10 |
| ESTUDIO DE BK EN MUESTRA A DEFINIR CHLA BACTERIOLOGÍA | A DEFINIR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Es necesario llenar el formulario del MSP. Enviar Domicilio y teléfono del paciente. Coordinar con el LAC. | 45 |
| ESTUDIO DE SENSIBILIDAD A LOS ANTIFUNGICOS | MICOLÓGICO | HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE | | 7 |
| ESTUDIO DEL METABOLISMO ÓSEO | SUERO + ORINA | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación + FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Orina sin conservante, primera o segunda micción de la mañana antes de 10.00 AM. | 3 |
| ESTUDIO MICOLÓGICO | A DEFINIR | HISOPO SIN MEDIO DE TRANSPORTE | | 30 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO PARASITOLÓGICO DE MATERIAL RECIBIDO | A DEFINIR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 5 |
| ESTUDIO PARASITOLÓGICO DE PIEL | PIEL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |
| ETOSUXIMIDA (ETX) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. La muestra debe ser enviada al laboratorio o centrifugada en las dos horas siguientes a la extracción; en este caso separar el suero. | 5 |
| EUGLOBULINAS TIEMPO DE LISIS (FECLT) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA CITRATADO | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. La muestra debe ser enviada URGENTE al LAC, en la media hora siguiente a la extracción para ser acondicionada adecuadamente. O se debe centrifugar dentro de la media hora siguiente a la toma y freezar inmediatamente, ya que al Lac debe llegar congelada. | 10 |
| EVALUACIÓN CS | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO + SUERO + ORINA FRESCA | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |
| EVALUACIÓN MP | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO + SUERO + ORINA FRESCA | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |
| EVALUACIÓN MULTIDISCIPLINARIA HOMBRE | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO + SUERO + ORINA FRESCA | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |
| EVALUACIÓN MULTIDISCIPLINARIA MUJER | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO +SUERO + ORINA FRESCA | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| EVEROLIMUS (EVROL) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| EXOMA SECUENCIACION COMPLETA (ZW221-1500) EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 84 |
| EXPECTORACIÓN ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | EXPECTORACIÓN | LAMINA G | Ver Manual de Instrucciones. | 5 |
| EXUDADO CONJUNTIVAL DERECHO ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | EXUDADO CONJUNTIVAL DERECHO | HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE | Ver Manual de Instrucciones. | 5 |
| EXUDADO CONJUNTIVAL IZQUIERDO ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | EXUDADO CONJUNTIVAL IZQUIERDO | HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE | Ver Manual de Instrucciones. | 5 |
| EXUDADO DE QUISTE ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | EXUDADO DE QUISTE | HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE | | 3 |
| EXUDADO FARÍNGEO ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | EXUDADO FARÍNGEO | HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE | Ver Manual de Instrucciones. | 5 |
| EXUDADO NASAL ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | EXUDADO NASAL | HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE | Ver Manual de Instrucciones. | 5 |
| EXUDADO OTICO DERECHO ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | EXUDADO OTICO DERECHO | HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE | Ver Manual de Instrucciones. | 5 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| EXUDADO OTICO IZQUIERDO ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | EXUDADO OTICO IZQUIERDO | HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE | Ver Manual de Instrucciones. | 5 |
| EXUDADO URETRAL ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | SECRECIÓN URETRAL | HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE | Ver Manual de Instrucciones. | 5 |
| EXUDADO VAGINAL BÚSQUEDA DE E.B.H. ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | EX.VAGINAL BÚSQ. DE EBH | HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE | Toma vaginal y toma rectal. | 5 |
| EXUDADO VAGINAL BÚSQUEDA DE GONOCOCO | EX.VAGINAL | HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE | Ver Manual de Instrucciones para exudado vaginal estudio bacteriológico. | 5 |
| EXUDADO VAGINAL ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | EX.VAGINAL | HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE | Ver Manual de Instrucciones. | 5 |
| FABRY ENFERMEDAD DE (FABRZ) GEN GLA ANÁLISIS EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 23 |
| FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASC. (VEGF) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | EDTA / TAPÓN LILA | Ayuno mínimo 8 horas. Colocar el tubo en baño con hielo. Antes de los 30 minutos, la muestra debe ser centrifugada y el plasma separado. Enviar la misma manteniendo la cadena de frío. | 12 |
| FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA TNF (FNFAS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 12 |
| FACTOR DE NECROSIS TUMORAL (TNFA) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 12 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| FACTOR H (B-1H) DETRMIANCIÓN EN PLASMA | PLASMA CONGELADO | EDTA / TAPÓN LILA | | 31 |
| FACTOR II COAGULANTE DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |
| FACTOR INTRÍNSECO Anticuerpos Anti IFBA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Esta prueba no debe realizarse si el paciente recibió Vitamina B12 en las últimas 2 semanas. | 7 |
| FACTOR IX COAGULANTE (CH9) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |
| FACTOR IX INHIBIDOR DEL DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |
| FACTOR REUMATOIDEO (ZW242/83516) EN LIQUIDO ARTICULAR | Líquido Sinovial | Tubo Estéril / Tapa Roja | | 10 |
| FACTOR REUMATOIDEO (ZW242/83516) DETERMINACIÓN EN LÍQUIDO PERICÁRDICO | Líquido pericárdico | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| FACTOR REUMATOIDEO (ZW242/83516) DETERMINACIÓN EN LP | LÍQUIDO PLEURAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |
| FACTOR REUMATOIDEO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| FACTOR V COAGULANTE (FACTV) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |
| FACTOR V LEIDEN ESTUDIO GENÉTICO EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| FACTOR VII COAGULANTE (F_7) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |
| FACTOR VII INHIBIDOR DEL DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |
| FACTOR VIII COAGULANTE (F8A) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| FACTOR VIII CROMOGÉNICO ACTIVIDAD (F8A) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA CITRATO | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 3 |
| FACTOR VIII INHIBIDOR DEL (F8INH) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |
| FACTOR VON WILLEBRAND AFINIDAD AL COLÁGENO | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |
| FACTOR VON WILLEBRAND DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |
| FACTOR VON WILLEBRAND POST DESMOPRESINA DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| FACTOR X ACTIVADO ANTI DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA CITRATO | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas / Realizar extracción a las 3 hs de la última dosis. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado con la siguiente información:<br>- Anticoagulante que recibe el paciente.<br>- Dosis y hora de administración del Anticoagulante.<br>- Hora de toma de la muestra.<br>- Peso (en caso de niños).<br>Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 1 |
| FACTOR X ACTIVADO DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA CITRATO | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas / Realizar extracción a las 3 hs de la última dosis. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado con la siguiente información:<br>- Anticoagulante que recibe el paciente.<br>- Dosis y hora de administración del Anticoagulante.<br>- Hora de toma de la muestra.<br>- Peso (en caso de niños).<br>Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |
| FACTOR X COAGULANTE (F_10) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |
| FACTOR XI COAGULANTE DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| FACTOR XII COAGULANTE (F_12) DETERMINACIÓN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |
| FACTOR XIII DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |
| FBN1 (SD. MARFAN) SECUENCIACIÓN DEL GEN | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 25 |
| FENILCETONURIA-FENILALANINA TIROSINA (PKU) EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 4 horas**.** | 10 |
| FENOBARBITAL DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Realizar toma antes de ingerir medicamento. | 3 |
| FENOLES (FPHEN) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Al final de la jornada laboral. | 15 |
| FERRITINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| FERTILIDAD HORMONAS DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| FIBRINÓGENO DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 3 |
| FIBROSIS QUÍSTICA CFTR SECUENCIACIÓN - MLPA DEL GEN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 45 |
| FIBROSIS QUÍSTICA GEN CFTR PANEL DE 500 VARIANTES (CFMP) EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 25 |
| FIEBRE MACULOSA (SFGP) ANTICUERPOS ANTI IGG-IGM DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| FIEBRE MEDITERRÁNEA FAMILIAR (MEFV) SECUENCIACIÓN DEL GEN | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Extraer dos tubos de EDTA. Enviar a temperatura ambiente. | 45 |
| FIEBRE MEDITERRÁNEA FAMILIAR LAS 5 MUTACIONES MÁS FRECUENTES (ZW153/MML70)DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Extraer dos tubos de EDTA. Enviar a temperatura ambiente. | 35 |
| FIEBRE Q COXIELLA BURNETTI FI (QFP) AC.ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| FIEBRE Q COXIELLA BURNETTI FII (QFP) AC.ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| FIEBRE Q COXIELLA BURNETTI FI-II AC.ANTI (QFP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| FILARIA ANTICUERPOS ANTI IgG4 (FFAG4) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 23 |
| FLUNITRAZEPAM (FFLRO) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| FLUORUROS (FL) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | HEPARINA | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| FLUOXETINA DETERMINACIÓN (FLUOX) EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas / realizar toma antes de ingerir medicamento. | 3 |
| FÓRMICO ÁCIDO (FORAU) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada. | 14 |
| FÓRMICO ÁCIDO (FORAC) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | | 14 |
| FOSFATASA ÁCIDA PROSTÁTICA PACP DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| FOSFATASA ACIDA TOTAL DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| FOSFATASA ALCALINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| FOSFATASA ALCALINA FRACCIÓN (BAP) ÓSEA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 6 |
| FOSFATASA ALCALINA ISOENZIMAS (ALKI) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 8 |
| FOSFATASA ALCALINA ISOENZIMAS DETERMINACIÓN EN LCR | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 15 |
| FOSFATIDLSERINA/PROTROMBINA ANTICUERPOS ANTI IGG-M (PSPT) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 12 |
| FOSFOLIPASA A2 ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR (PMND1) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 14 |
| FOSFOLÍPIDOS ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| FÓSFORO DETERMINACIÓN EN ORINA 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas | 3 |
| FÓSFORO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| FOXC1 GEN MLPA EVALUACIÓN DEL/DUPL EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 40 |
| FOXC1 SECUENCIACIÓN DEL GEN (SD. AXENFELD-RIEGER) EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 40 |
| FRAGILIDAD CROMOSÓMICA | SANGRE ENTERA HEPARINIZADA | HEPARINA | Enviar la muestra lunes o martes en la mañana. | 40 |
| Francisella Tularensis AC. ANTI (TULAB) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| FRUCTOSAMINA (FRUCT) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 6-8 horas. Centrifugar en las dos horas siguientes a la extarcción. enviar refrigerado | 6 |
| FSH-HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| FTA ABS Ig. M DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| FTA-ABS DETERMINACIÓN EN LCR IGG | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| FTA-ABS DETERMINACIÓN EN LCR IGM | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| FTA-ABS DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| FUNCIONAL HEPÁTICO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| FUNCIONALIDAD RENAL DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| FUROSEMIDE DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. La extracción de sangre del paciente para la monitorización de este diurético debe ser realizada en las primeras 2 horas después de su administración debido al corto tiempo de vida media de la Furosemida. | 15 |
| GABA-B-RECEPTOR AC.ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO (PRUEBA REFELJA) | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 10 |
| GABAPENTINA (GABA) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | La extracción se debe hacer justo antes de la siguiente dosis de la medicación.<br>La muestra en caso de ser enviada al laboratorio debe ser se centrifugada antes de pasadas 2 hs de la extracción. | 6 |
| GALACTITOL (GATOL) CUANTIFICACIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 12 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| GALACTOCEREBROSIDASA LEUCOCITARIA (GALCW) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 18 |
| GALACTOMANANO ANTÍGENO DE ASPERGILLUS DETERMINACIÓN EN LBA | LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Enviar la muestra refrigerada antes de las 48 horas al laboratorio. | 3 |
| GALACTOMANANO ANTÍGENO DE ASPERGILLUS DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | La toma de sangre debe ser realizada en un tubo con sistema de vacío (tubo seco con gel) exclusivo para realizar este estudio. Enviar el tubo primario luego de centrifugar, sin abrirlo. El paciente debe tener un ayuno de 6 a 8 horas. | 3 |
| GALACTOSA (GALU) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 18 |
| GALACTOSA 1 FOSFATO (GAL1P) DETERMINACION EN GLÓBULOS ROJOS | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Coordinar con el LAC. | 20 |
| GALACTOSA DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE ENTERA HEPARINIZADA | HEPARINA | | 20 |
| GALACTOSA-1-FOSFATO URIDYLTRANSFERASA (GALT) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 8 |
| GAMA BUTÍRICO ACIDO (FGHSP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | | 15 |
| GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| GANGLIÓSIDOS AC.ANTI,Asialo-GM1,GM1,GM2,GD1a-b,GQ1b(FGAGM) DETERMINACIÓN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 12 |
| GASOMETRÍA ARTERIAL | SANGRE TOTAL | JERINGA HEPARINA | Efectuar la extracción con jeringa específica de Gasometría y enviarla refrigerada a la brevedad al laboratorio. | 1 |
| GASOMETRÍA VENOSA | SANGRE TOTAL | JERINGA HEPARINA | Efectuar la extracción con jeringa específica de Gasometría y enviarla refrigerada a la brevedad al laboratorio. | 1 |
| GASTRINA (GAST) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Suero 1 mL refrigerado. Centrifugar y separar el suero antes de pasadas dos horas post extracción. Refrigerar y enviar en el día. Durante las doce horas previas a la extracción no tomar multivitaminas o suplementos dietéticos que contengan Biotina o Vitamina B7 que se encuentran comúnmente en suplementos de pelo, piel y uñas. De ser autorizado por el médico suspender durante una semana los fármacos inhibidores de la bomba de protones. Medicamentos que interfieren con la motilidad gastrointestinal (ej. Opioides) deberían suspenderse al menos 2 semanas antes de la prueba de Gastrina sérica. | 7 |
| GEN MLL REORDENAMIENTO DEL GEN FISH EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | | 5 |
| GENTAMICINA DETERMINACIÓN EN LÍQUIDO BIOLÓGICO | Líquido de Punción | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| GENTAMICINA (FGENT) DETERMINACIÓN EN LCR | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | 1 mL de LCR Refrigerado. | 8 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| GENTAMICINA EN SUERO (PICO) | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 3 |
| GENTAMICINA EN SUERO (VALLE) | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 3 |
| GLIADINA ANTICUERPOS (IGG-IGA) ANTI DPG DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| GLIADINA ANTICUERPOS ANTI IGA (DAGL) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 8 |
| GLICOPROTEÍNA DEL OLIGODENDROCITO ASOC. A MIELINA AC. ANTI (MOGFS) DET.SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 12 |
| GLOBULINA FIJADORA DE LA TIROXINA (TBGI) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| GLÓBULOS BLANCOS EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Se recomienda ayuno de 4 horas | 3 |
| GLUCAGÓN DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno de 8 horas. Pre enfriar tubos de EDTA en agua con hielo. Efectuar extracción. Mantener tubos en baño con hielo. Centrifugar en centrífuga refrigerada. Luego de centrifugada la muestra, remover el plasma colocarlo en un vial de plástico y congelarlo a -20º. | 15 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA ACTIVIDAD (G6PD1) DETERMINACIÓN EN GLÓBULOS ROJOS | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 7 |
| GLUCOSA CURVA DE TOLERANCIA (3) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA FLUORURO | FLUORURO / TAPÓN GRIS | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| GLUCOSA CURVA DE TOLERANCIA (4) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA FLUORURO | FLUORURO / TAPÓN GRIS | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| GLUCOSA CURVA DE TOLERANCIA (5) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA FLUORURO | FLUORURO / TAPÓN GRIS | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| GLUCOSA CURVA DE TOLERANCIA (6) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA FLUORURO | FLUORURO / TAPÓN GRIS | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| GLUCOSA CURVA DE TOLERANCIA DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA FLUORURO | FLUORURO / TAPÓN GRIS | Ayuno mínimo 8 horas. Ver Manual de Instrucciones. | 3 |
| GLUCOSA CURVA DE TOLERANCIA EMBARAZO DETERMINACIÓN EN SANGRE | PLASMA FLUORURO EMB | FLUORURO / TAPÓN GRIS | Ayuno mínimo 8 horas. Ver Manual de Instrucciones. | 3 |
| GLUCOSA DETERMINACIÓN EN SANGRE | PLASMA FLUORURO | FLUORURO / TAPÓN GRIS | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA FLUORURO | FLUORURO / TAPÓN GRIS | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| GLUCOSA-UREA-CREATININA EN SANGRE | FLURURO / SUERO | FLUORURO / TAPÓN GRIS + SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| GLUTAMATO DECARBOXILASA ANTICUERPOS ANTI (GAD65C) DETERMINACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |
| GLUTAMATO DECARBOXILASA ANTICUERPOS ANTI (GD65S) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| GLUTATION (GSH) DETERMINACIÓN EN SANGRE | Sangre Entera ACD | ACD Tapón Dorado | | 18 |
| GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (THCG) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 10 |
| GONOCOCO EN EXUDADO URETRAL ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | URETRAL GONOCOCO | HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE | | 5 |
| GRANULOCITOS ANTICUERPOS ANTI (LAGGT) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 18 |
| GRUPO SANGUÍNEO Y RH | SANGRE EDTA GRUPOS | EDTA / TAPÓN LILA | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B IGG AC. ANTI RESPUESTA/VACUN (HIBS) DET. SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 9 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| HALOPERIDOL (HALO) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas / realizar toma antes de ingerir medicamento. | 8 |
| HANTAVIRUS ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Es necesario llenar el formulario del MSP. Enviar Domicilio y teléfono del paciente. Coordinar con el laboratorio. | 7 |
| HAPTOGLOBINA (HAPT) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 5 |
| HAV HEPATITIS A Ig.M AC.ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| HAV HEPATITIS A IGG ANTICUERPOS ANTI (HAIGG) DETERMINACÍÒN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 6 |
| HBB GEN DE LA BETA HEMOGLOBINA SECUENCIACIÓN DEL GEN | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 20 |
| HBV ANTICUERPOS ANTI AG. SUP. HEPATITIS B DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| HBV ANTICUERPOS ANTI AG.E HEPATITIS B DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| HBV ANTÍGENO E HEPATITIS B DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| HBV ANTÍGENO SUP. (AG.AUSTRALIA) HEPATITIS B DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| HBV CARGA VIRAL HEPATITIS VIRUS B DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA EDTA | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 4 |
| HBV CORE IG.M AC. ANTI HEPATITIS B DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| HBV CORE TOTAL AC.ANTI HEPATITIS B DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| HBV HEPATITIS B MARCADORES DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| HBV HEPATITIS VIRUS B - ADN PCR DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| HCV CARGA VIRAL HEPATITIS C PCR DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| HCV GENOTIPO HEPATITIS C DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA EDTA | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| HCV HEPATITIS C ANTICUERPOS DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| HCV HEPATITIS C CONFIRMATORIO ANTICUERPOS ANTI (HCVL) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 18 |
| HCV HEPATITIS C GENOTIPIFICACIÓN 1 NS5a RESISTENCIA (FH1N5) EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 11 |
| HCV HEPATITIS C GENOTIPIFICACIÓN 1 NS5b RESISTENCIA (FHEPC) EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 21 |
| HCV HEPATITIS C GENOTIPIFICACIÓN 3 NS5a RESISTENCIA (FH3N5) EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 22 |
| HE4 PROTEÍNA EPIDIDÍMICA HUMANA 4 DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| HELICOBACTER PYLORI AC. ANTI IG. G-A-ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 7 |
| HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENOS DETERMINACIÓN EN MATERIA FECAL | MATERIA FECAL | FRASCO / MATERIA FECAL | Enviar la muestra refrigerada dentro de las 48 horas de su obtención. Cuando esto no sea posible, congelar la muestra a -20 °C o a una temperatura más baja, deberá recibirse en el laboratorio congelada.<br>La congelación y descongelación repetida de las muestras debe limitarse, puede provocar la degradación o proteólisis del antígeno y provocar la pérdida de actividad. | 7 |
| HEMATOCRITO | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Sin ayuno. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA ESTUDIO DEL GEN (HFE) EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Enviar la muestra refrigerada. | 12 |
| HEMOCULTIVO I ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | HEMOCULTIVO | HEMOCULTIVO | Ver Manual de Instrucciones. | 7 |
| HEMOCULTIVO II ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | HEMOCULTIVO2 | HEMOCULTIVO | Ver Manual de Instrucciones. | 7 |
| HEMOCULTIVO III ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | HEMOCULTIVO3 | HEMOCULTIVO | Ver Manual de Instrucciones. | 7 |
| HEMOGLOBINA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Sin ayuno. | 3 |
| HEMOGLOBINA ELECTROFORESIS DE (HBEL1) | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| HEMOGLOBINA ESTUDIO MOLECULAR | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 15 |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE ENTERA | EDTA / TAPÓN LILA | Ayuno mínimo de 6 horas. | 3 |
| HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA INMUNOFENOTIPO | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Ayuno mínimo 8 horas.1 tubo de sangre con EDTA de adulto para utilizar en caso de solicitud de muestra para niños y 2 tubos EDTA en caso de solicitud de muestra para adultos. | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| HEMOGRAMA COMPLETO | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Se recomienda ayuno de 4 horas. | 3 |
| HEMOSIDERINA (UHSD1) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 6 |
| HEPARINA-PF4 ANTICUERPOS ANTI IGG (HITIG) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| HEPARINA-PF4 ANTICUERPOS (HIT) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | | 7 |
| HEPATITIS A PCR CUALITATIVA (ZW117) DETERMINACIÓN EN SANGRE | PLASMA EDTA (1.5ml) | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Centrifugar y separar el plasma antes de pasada 1 hora de la extracción. Enviar refrigerado en el día | 15 |
| HEPATITIS AUTOINMUNE MARCADORES PANEL I DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| HEPATITIS D ANTICUERPOS ANTI (AHDV) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| HEPATITIS E- ANTI IGM CONFIRMATORIO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 24 |
| HEPATITIS E ANTICUERPOS ANTI (HEVG-HEVM) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 13 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| HEPATITIS E PCR CUANTITATIVA (HEVQU) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 13 |
| HEPCIDINA (ZW298) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA EDTA | EDTA / TAPÓN LILA | | 20 |
| HER2 AMPLIFICACIÓN ASOCIADOS CON EL CÁNCER DE MAMA (H2BR) EN TEJIDO | ANATOMÍA PATOLÓGICA | ANATOMÍA PATOLÓGICA | | 13 |
| HERIDA CULTIVO ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | HERIDA | HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE | | 5 |
| HERPES FAMILIA ADN / PCR DETECCIÓN EN LÍQUIDOS, LESIONES & OTROS | A DEFINIR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 2 |
| HERPES FAMILIA ADN / PCR DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 7 |
| HERPES1-2-VARICELLA ZOSTER DETERMINACIÓN EN CÓRNEA | CÓRNEA PCR | CÓRNEA SUERO FISIOLÓGICO | | 3 |
| HERPES SIMPLEX & VARICELLA ZOSTER (LHSVZ) DETECCIÓN MOLECULAR EN LAVADO ALVEOLAR | LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 6 |
| HERPES SIMPLEX 1 -2 ADN / PCR | A DEFINIR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| HERPES SIMPLEX 1-2 Ig.G AC.ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| HERPES SIMPLEX 1-2 IGG - IGM DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| HERPES SIMPLEX 1-2-Ig.M AC.ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| HERPES VIRUS HUMANO 6 ADN (HHV6) DETECCIÓN EN PLASMA | PLASMA EDTA | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Centrifugar la muestra luego de su recolección. Separar el plasma y enviar al laboratorio el plasma refrigerado o congelado el mismo día o al siguiente de la extracción, de lunes a jueves. | 5 |
| HERPES VIRUS HUMANO 7 ANTICUERPOS ANTI IGG-M (FH7GM) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 24 |
| HERPES VIRUS HUMANO 7 DNA PRO PCR (FHV7D) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | La muestra debe ser enviada al laboratorio el mismo día o al siguiente de la extracción, de lunes a jueves. Enviar refrigerada. | 7 |
| HERPES VIRUS HUMANO 8 ESTUDIO HISTOQUÍMICO (HRPV8) EN TEJIDO | ANATOMÍA PATOLÓGICA | ANATOMÍA PATOLÓGICA | | 9 |
| HERPES VIRUS HUMANO 8 DNA POR PCR (FH8RP) DETERMINACIÓN CUANTITATIVA EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | La muestra debe ser enviada al laboratorio el mismo día o al siguiente de la extracción, de lunes a jueves. Enviar refrigerada. | 10 |
| HEXOSAMINIDASA A (MUGS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 45 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| HEXOSAMINIDASA A Y TOTAL (NAGR) DETERMINACIÓN LEUCOCITARIA | SANGRE ENTERA ACD | ACD TAPÓN DORADO | | 12 |
| HEXOSAMINIDASA A Y TOTAL (NAGS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 9 |
| HIBRIDACIÓN GENOMICA COMPARADA EN ARRAY | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 45 |
| HIDATIDOSIS EIA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO | | 10 |
| HIDATIDOSIS (QH) AC.ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| HIPEROXALURIA PANEL (HYOX) DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 18 |
| HIPEROXALURIA PRIMARIA TIPO 1 (AGXTZ) SECUENCIACIÓN DEL GEN AGXT EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 25 |
| HIPEROXALURIA PRIMARIA TIPO 2 (GRHPZ) SECUENCIACIÓN DEL GEN GRHPR EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 25 |
| HIPOGLICEMIANTES AGENTES (HYPOG) TAMIZAJE EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | | 11 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| HIPÚRICO ÁCIDO (HIPA) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Al final de la jornada laboral. | 15 |
| HISTAMINA (FH24U) DETERMINACIÓN EN ORINA 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 15 |
| HISTAMINA (FHSPL) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA CONGELADO | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Poner la muestra en hielo inmediatamente luego de la extracción. La muestra debe llegar al laboratorio dentro de los 20 minutos post extracción. Si no es posible, se deberá centrifugar dentro de los 20 minutos post extracción, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio la muestra congelada. | 14 |
| HISTOPLASMA CAPSULATUM AC.ANTI (SHSTO) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| HISTOPLASMA CAPSULATUM ANTÍGENOS (FHIST) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 9 |
| HISTOPLASMA CAPSULATUM ANTÍGENOS (HSTQU) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Orina aislada refrigerada (mín. 5 mL). | 7 |
| HISTOPLASMA CAPSULATUM/BLASTOMYCES DERMATITIDIS (HBRP) DETECCIÓN MOLECULAR EN LBA | LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| HISTOPLASMA CAPSULATUM/BLASTOMYCES DERMATITIDIS(HBRP) DETECCIÓN MOLECULAR EN PUNCIÓN PULMONAR | Líquido de Punción | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| HIV - PCR ESTUDIO CONFIRMATORIO | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| HIV ANTÍGENO / ANTICUERPO ANTI CONTROL II DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno de 8 horas. | 3 |
| HIV ANTÍGENO / ANTICUERPO ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| HIV ANTÍGENO p.24 DETERMINACIÓN EN SANGRE | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| HIV CARGA VIRAL (HIVQN) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA EDTA | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo de 4 horas. Extraer dos tubos de EDTA, separar el plasma y congelar a la brevedad. Enviar congelado. | 10 |
| HIV GENOTIPIFICACIÓN | SANGRE TOTAL | 3 EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Requiere de la autorización por parte del MSP. La Institución solicitante debe completar un formulario que deberá ser enviado desde un correo institucional al MSP al Programa correspondiente: **trprogramasida@msp.gub.uy** Ayuno 4-6 horas, y enviar las muestras refrigeradas en el momento (el mismo día de obtenida) a la Dirección General de la Salud. | 30 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| HIV GENOTIPIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE MUTACIONES RESISTENTES | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 30 |
| HIV RESISTENCIA A DROGAS NIC (HIVI) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 30 |
| HIV RESISTENCIA A DROGAS NRTI (HIVPR) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 14 |
| HLA CLASE I TIPIFICACIÓN MOLECULAR ASOCIADA A ENFERMEDADES (DISI) EN SANGRE | SANGRE ENTERA ACD | ACD TAPÓN DORADO | | 12 |
| HLA CLASE II DRB1-w-3-4 DR-DQ-DQB1 (2DIS) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE ENTERA ACD | ACD TAPÓN DORADO | | 14 |
| HLA-A-B-C (1DIS) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE ENTERA ACD | ACD TAPÓN DORADO | | 12 |
| HLA-B 5701 GENOTIPIFICACIÓN HIPERSENSIBILIDAD AL ABACAVIR (HL57R) EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 9 |
| HLAB-27 (LY27B) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. La muestra debe ser enviada al laboratorio el mismo día de la extracción y llegar al laboratorio lunes o miércoles antes de las 10:00. Enviar la muestra a temperatura ambiente. | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| HLA-B51 (ZW121-2275) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Enviar a temperatura ambiente. | 14 |
| HOMAir ÍNDICE DE RESISTENCIA A LA INSULINA | PLASMA FLUORURO +SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| HOMOCISTEINA BASAL Y POST METIONINA EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Se requiere ayuno de 6 a 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y enviar al laboratorio antes de las 3 horas desde la extracción. Si no fuera posible, separar el suero y refrigerar (2 a 8 °C). Enviar al laboratorio refrigerado. | 3 |
| HOMOCISTEINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Se requiere ayuno de 6 a 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y enviar al laboratorio antes de las 3 horas desde la extracción. Si no fuera posible, separar el suero y refrigerar (2 a 8 °C). Enviar al laboratorio refrigerado. | 3 |
| HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROPINA (FGNRH) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. Si es posible, el paciente no debe tomar ningún medicamento con esteroides, ACTH, gonadotropina o estrógeno, por lo menos 48 horas antes de la recolección. En el caso de enviar la muestra separar inmediatamente luego de la extracción y congelar. | 12 |
| HPV GENOTIPIFICACIÓN DE 14 TIPOS DE ALTO RIESGO EN CITOLOGÍA EN BASE LÍQUIDA | HPV / CITOL.LIQ | HPV / CITOL.LIQ | | 10 |
| HPV GENOTIPOS DE ALTO RIESGO (HPVHR) DNA HIBRIDACIÓN IN SITU | TEJIDO | TACO DE PARAFINA / LÁMINAS | | 11 |
| HTLV 1-2 ANTICUERPOS ANTI (HTLVC) DETERMINACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 8 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| HTLV 1-2 ANTICUERPOS ANTI (HTLVI) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 9 |
| HTLV 1-2 ANTICUERPOS ANTI PRUEBA CONFIRMATORIA (HTLVL) DETERMINACIÓNEN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 15 |
| HTLV 1-2 DNA PCR (FHTL) DETERMINACIÓN CUALITATIVA EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 7 |
| Hu ANTICUERPOS [ANNA-1] DETERMINACIÓN EN SANGRE | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| IDENTIFICACIÓN DE AGENTE MALDI | CULTIVO EN PLACA | PLACA DE CULTIVO | | 1 |
| IDENTIFICACIÓN DE AGENTE MICOLÓGICO MALDI | CULTIVO EN PLACA | PLACA DE CULTIVO | | 2 |
| IDENTIFICACIÓN DE FUENTE DE MUESTRA (SPCID) | ID FUENTE | ID CONOCIDO | | 10 |
| IGA1 IGA2 DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 40 |
| IGE ESP. CACAO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO | | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| IGF-1 SOMATOMEDINA C (IGFMS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO IM | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno de 8 horas. Mantener el tubo a temperatura ambiente o refrigerado, y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 72 horas de su extracción. Si no fuera posible separar el suero y congelar. Enviar al laboratorio el suero congelado. | 7 |
| IGF-1 SOMATOMEDINA C PRE - POST EJ. DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. Mantener el tubo a temperatura ambiente o refrigerado, y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 72 horas de su extracción. Si no fuera posible separar el suero y congelar. Enviar al laboratorio el suero congelado. | 15 |
| IGF-2 FACTOR DE CRECIMIENTO INSULÍNICO TIPO 2 (FIGF2) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Separar y congelar antes de los 60 minutos, enviar congelado. | 21 |
| IGFBP-1 PROT.TRANS.FACT.CREC. DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Centrifugar y separar antes de 1 hora post extracción. | 10 |
| IGFBP-3 PROT.TRANS.FACT.CREC. DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| IGG - ALBÚMINA INDICES (INDICES IgG) | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | 1 mL de LCR Refrigerado. | 7 |
| IGH GEN REORDENAMIENTO 14q32 DETERMINACIÓN EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | | 7 |
| IGHMBP2 Atrofia Muscular Espinal c/distrés Resp.Tipo 1 SECUENCIACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 49 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| IMIPRAMINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas / realizar toma antes de ingerir medicamento. | 7 |
| INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES (TMSI) EN BIOPSIA | TEJIDO | TACO DE PARAFINA / LÁMINAS | | 12 |
| INFLIXIMAB CONCENTRACIÓN & ANTICUERPOS ANTI (INFXR) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | Ayuno de 8 horas.<br>Durante las 12 hs previas a la extracción no ingerir multivitaminas o suplementos dietéticos que contengan biotina (vitamina B7) que se encuentran comúnmente en suplementos de pelo, piel y uñas. Centrifugar y separar antes de las 2 hs. post extracción. | 10 |
| INFLUENZA A VIRUS ANTICUERPOS ANTI (ZW24/2004421) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 8 |
| INFLUENZA B VIRUS ANTICUERPOS ANTI (ZW242/2004422) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 8 |
| INFLUENZA VIRUS A-B & RESPIRATORI SYNC. (FLUMS ) DETECCIÓN MOLECULAR LVA | LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 6 |
| INFLUENZA VIRUS / RSV PCR EN SECRECIÓN RESPIRATORIA | NASOFARÍNGEA | MEDIO DE TRANSPORTE UTM | Ver Manual de Instrucciones. | 2 |
| INHIBIDORES DEL FACTOR II DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| INHIBINA A (INHA) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| INHIBINA B (INHB) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Enviar al laboratorio la muestra en ambiente refrigerado. | 10 |
| INIHIBINA B DIMERICA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| INMUNOELECTROFORESIS EN ORINA | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas | 10 |
| INMUNOELECTROFORESIS EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | | 3 |
| INMUNOFENOTIPO EN LAVADO BRONQUIO ALVEOLAR | LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Enviar la muestra y dato clínico, de lunes a viernes en la mañana. | 3 |
| INMUNOFENOTIPO INVESTIGACIÓN EN LÍQUIDO DE ASCITIS | LÍQUIDO PERITONEAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Enviar la muestra y dato clínico, de lunes a viernes en la mañana. | 3 |
| INMUNOFENOTIPO INVESTIGACIÓN EN LÍQUIDO PERICÁRDICO | A DEFINIR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Enviar la muestra y dato clínico, de lunes a viernes en la mañana. | 3 |
| INMUNOFENOTIPO INVESTIGACIÓN EN PUNCIÓN RENAL | LÍQUIDO EN PUNCIÓN | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Enviar la muestra y dato clínico, de lunes a viernes en la mañana. | 5 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| INMUNOFENOTIPO INVESTIGACIÓN EN GANGLIO | TEJIDO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Enviar la muestra y dato clínico, de lunes a viernes en la mañana. | 7 |
| INMUNOFENOTIPO INVESTIGACIÓN EN LCR | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Se requiere dato clínico. Coordinar con LAC el envío de tubo especial para acondicionar la muestra (TRANSFIX). Envío de lunes a viernes en la mañana. | 3 |
| INMUNOFENOTIPO INVESTIGACIÓN EN LÍQUIDO PLEURAL | LIQUIDO PLEURAL | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Enviar la muestra y dato clínico, de lunes a viernes en la mañana. | 10 |
| INMUNOFENOTIPO INVESTIGACIÓN EN MEDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | EDTA / TAPÓN LILA | Enviar la muestra y dato clínico, de lunes a viernes en la mañana. | 10 |
| INMUNOFENOTIPO INVESTIGACIÓN EN PUNCIÓN VERTEBRAL | TEJIDO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Enviar la muestra y dato clínico, de lunes a viernes en la mañana. | 2 |
| INMUNOFENOTIPO INVESTIGACIÓN EN SANGRE PERIFÉRICA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Ayuno mínimo 8 horas. Enviar la muestra y dato clínico, de lunes a viernes en la mañana. | 20 |
| INMUNOFIJACIÓN ANÁLISIS PROTÉICO EN ORINA | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas | 10 |
| INMUNOFIJACIÓN ANÁLISIS PROTÉICO EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| INMUNOGLOBULINA A ANTICUERPOS ANTI (FIGA) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| INMUNOGLOBULINA A DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| INMUNOGLOBULINA A SUBCLASES (IGAS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| INMUNOGLOBULINA A1 DETERMINACIÓN EN SANGRE | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| INMUNOGLOBULINA A2 DETERMINACIÓN EN SANGRE | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| INMUNOGLOBULINA D (IGD) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 6 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI ALBÚMINA BOVINA (BOV) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 10 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI ALFA LACTOALBUMINA (ALFA) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 10 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI ALIMENTOS DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI AMOXICILINA (AMOXY) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI AMPICILINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 6 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI ANIMALES DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI ARÁNDANO (BLUE) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 6 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI ARÁNDANO ROJO (CRANB) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 6 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI AVENA (OATS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 8 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI BERENJENA (EGGP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno de 8 horas. | 7 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI BETA LACTOGLOBULINA (BLAC) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 10 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI CALAMAR (SQUID) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 12 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI CARNE DE CERDO (PORK) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI CASEINA (CASE) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 10 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI CEBADA (BRLY) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI CEFALOSPORINAS DETERMIN. EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 7 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI CENTOLLA (CRAB) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI CIPRÉS (BCYP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI CLARA/HUEVO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI CONEJO EPITELIO DE (REPII) DETERMINACIÓN EN SU | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI CUCARACHA COMÚN (COCR) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI EPITELIO DE GATO (CAT) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 8 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANT EPITELIO DE HURÓN (FEEP) DETERMINACIÓN EN SUER | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 10 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI EPITELIO DE PERRO (DOGD) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 8 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI FORMALDEHIDO (FRMH) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 6 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI FRAMBUESA (RASP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 6 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI FRUTILLA (STBY) DETERMINACION EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI GLIADINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 10 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI GLUTEN (GLT) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI GRAMÍNEAS DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI GROSELA (RECR) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 6 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI HERBÁCEAS DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI HONGOS DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI INHALANTES DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI KIWI (KIWI) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 5 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI LANGOSTA (LOB) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI LANGOSTINO (SHRI) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI LATEX DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 6 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI LECHE DE CABRA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI LECHE DE VACA (MILK) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI LISOZYMA (LYSO) DETERM. EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 10 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI MAÍZ (CORN) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI MANÍ (PEAN) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 6 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI MORA (BLACK) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 7 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI MOSQUITO (MSPP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI NUEZ PECAN (PEC) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 6 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI OSTRA (OYST) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI OVOALBÚMINA (OVAL) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI OVOMUCOIDE (OVMU) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI ÓXIDO DE ETILENO (EOXD)DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI PALTA (AVOC) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI PAPA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI PENICILINA (PEVIV/PBPO) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 6 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI PINO (MEZCLA) (FPMLP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | | 12 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI Platanus sombra DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI POLEN DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI POLVOS DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI PULPO (OCTO) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 12 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI SALMÓN (SALM) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI SOJA (SOY) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 8 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI TRIGO (WHT) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI VENENO ABEJAS (HBV) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI VENENO DE AVISPA (WSPV)DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI VENENO DE HORMIGA (FANT) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA ANTI YEMA/HUEVO (YOLK) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| INMUNOGLOBULINA E TOTAL DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| INMUNOGLOBULINA G DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| INMUNOGLOBULINA G SUBCLASES (IGGS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 6 |
| INMUNOGLOBULINA M DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| INMUNOGLOBULINAS (G-A-M) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| INSULINA 2 MUESTRAS POST CARGA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| INSULINA 3 MUESTRAS POST CARGA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| INSULINA 6 MUESTRAS POST CARGA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| INSULINA ANTICUERPOS ANTI (INAB) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| INSULINA BASAL DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| INSULINA BASAL Y POST PRANDIAL DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| INSULINA CURVA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Ver Manual de Instrucciones. | 3 |
| INSULINA EN TRES TIEMPOS DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| INTERFERON GAMMA (FIFNY) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 15 |
| INTERLEUKINA 1 BETA (FINTB) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. Extraer la muestra de sangre y congelar el suero inmediatamente. No recibir Corticoesteroides o anti-inflamatorios en las 48 horas previas a la extracción. | 11 |
| INTERLEUKINA 2 (FIL2M) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 15 |
| INTERLEUKINA 2 RECEPTOR SOLUBLE (FIL2S) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | | 15 |
| INTERLEUKINA 6 (IL-6) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA EDTA | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno de 8 horas. Poner la muestra en hielo inmediatamente luego de la extracción y enviarla al laboratorio. En caso de ser necesario, centrifugar, separar y congelar antes de los 30 mín. post extracción. | 12 |
| INVERSIÓN (16) DETERMINACIÓN EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| IODO (IOD) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Muestra 1mL suero. Extraer tubo seco c/gel, esperar 30 min post extracción para centrifugar y separar. Transferir sin pipeta a otro tubo seco s/gel limpio. | 7 |
| IONOGRAMA DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas | 3 |
| IONOGRAMA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| ISO AGLUTININAS CON TÍTULO DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Se requiere de 3 tubos EDTA/TAPÓN LILA. Enviar la muestra de lunes a viernes antes de las 16 hs. | 4 |
| ITRACONAZOL (ITCON) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 6 |
| JAK2 ESTUDIO MOLECULAR MUTACIÓN V617F DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Coordinar con el LAC. Enviar la muestra y dato clínico de lunes a viernes antes de las 16:00. | 10 |
| JAK2 Exon 12 Y OTRAS MUTACIONES No-V617F (JAKXB) DETECCIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Coordinar con el LAC. La muestra debe ser enviada al laboratorio el mismo día de la extracción, los días lunes, miércoles y viernes antes de las 10;00. Enviar a temperatura ambiente o refrigerada. | 9 |
| JC POLYOMAVIRUS (FJCQP) CUANTIFICACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 9 |
| JC VIRUS (LCJC) DETECCIÓN MOLECULAR EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 9 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| JO ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | | 7 |
| KELL ANTÍGENO FENOTIPO DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL + SUERO | EDTA / TAPÓN LILA Derivación + SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Se recomienda ayuno de 4 horas | 3 |
| KIT Asp816Val ANÁLISIS (KITB) DE LA MUTACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Extraer dos tubos de EDTA. Enviar a temperatura ambiente. | 10 |
| KIT Asp816Val ANÁLISIS (KITBM) DE LA MUTACIÓN EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | EDTA / TAPÓN LILA | Se necesitan 2 mL de Médula Ósea en tubo de EDTA. | 10 |
| LA SS-B Anticuerpos Anti DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| LACTATO DETERMINACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 1 |
| LACTATO & PIRUVATO PANEL (LAPYP) DETERMINACIÓN EN PLASMA | HEPARINA SÓDICA | HEPARINA SÓDICA | | 12 |
| LACTATO VENOSO | SANGRE TOTAL | JERINGA HEPARINA | Efectuar la extracción con jeringa específica de Gasometría y enviarla refrigerada a la brevedad al laboratorio. | 1 |
| LACTOFERRINA (FLACF) DETERMINACIÓN EN MATERIA FECAL | MATERIA FECAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| LACTÓGENO PLACENTARIO HUMANO (FHPL) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 14 |
| LACTOSA ESTUDIO DEL POLIMORFISMO C.4170 T (Y1390X) EN MUCOSA YUGAL | MUCOSA YUGAL | HISOPO MUCOSA YUGAL | | 15 |
| LACTOSA ESTUDIO DEL POLIMORFISMO C.4170 T (Y1390X) EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 15 |
| LACTOSA INTOLERANCIA PROMETHEUS® LactoTYPE® (FPLAC) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 16 |
| LAL MULTIPLEX BCR-ALB1,KMT2A+AFF1, EVT6-RUNX1, TCF3-PBX1 EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | EDTA / TAPÓN LILA | | 15 |
| LAMINA DE SANGRE PERIFÉRICA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Sin ayuno. | 3 |
| LAMOTRIGINA (LAMO) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas / realizar toma antes de ingerir medicamento. Centrifugar en las dos horas siguientes a la extracción. | 7 |
| LAVADO BRONQUIO ALVEOLAR ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 5 |
| LC-1 AG.CITOSOL HEPÁTICO (ZW96-90535) AC-ANTI SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 40 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| LEFLUNOMIDE METABOLITO TERIFLUNOMIDE (LEFLU) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 9 |
| LEGIONELLA DETECCIÓN MOLECULAR (LEGRP) EN LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 8 |
| LEGIONELLA PNEUMOPHILA AC.ANTI (SLEG) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 9 |
| LEGIONELLA PNEUMOPHILA ANTÍGENOS DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 5 |
| LEISHMANIA (VISCERAL) LEIS ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 9 |
| LEPTINA (FLEP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| LEPTOSPIRA ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Es necesario llenar el formulario del MSP. Enviar Domicilio y teléfono del paciente. Coordinar con el laboratorio. | 7 |
| LESIÓN DE PIEL CULTIVO BACTERIOLÓGICO | LESIÓN DE PIEL | HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE | | 5 |
| LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA ESTUDIO MOLECULAR EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA ESTUDIO MOLECULAR EN MÉDULA ÓSEA. | MÉDULA ÓSEA | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 10 |
| LEUCINAMINOPEPTIDASA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| LEUCOCITOS EN ASCITIS / PERITONEAL | LIQUIDO PERITONEAL | EDTA / TAPÓN LILA | | 3 |
| LEUCOCITOS EN MATERIA FECAL | MATERIA FECAL | FRASCO / MATERIA FECAL | Muestra aislada | 5 |
| LEVETIRACETAM (LEVE) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 6 |
| LEVODOPA & CARBIDOPA (FSINS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | | 15 |
| LH-HORMONA LUTEINIZANTE DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| LINFOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA (ZW204-7524935) PANEL GENÉTICO SECUENCIACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 55 |
| LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCITICA SECUENCIACIÓN DEL GEN MUNC 13- 4 | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno de 8 horas. | 35 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCITICA SECUENCIACIÓN DEL GEN PRF1 | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno de 8 horas. | 35 |
| LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCITICA SECUENCIACIÓN DEL GEN STXBP2 | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno de 8 horas. | 35 |
| LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCITICA SECUENCIACIÓN GEN STX11 | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno de 8 horas. | 35 |
| LIPASA (LPBF1) DETERMINACIÓN EN LÍQUIDO PERITONEAL | LÍQUIDO PERITONEAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | LÍQUIDO PERITONEAL 2 mL | 7 |
| LIPASA (LPS1) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. La muestra debe ser enviada al laboratorio o centrifugada en las dos horas siguientes a la extracción; en este caso separar el suero. | 7 |
| LÍPIDOS QUILURIA (CSU) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 8 |
| LIPOPROTEÍNA "a" DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| LÍQUIDO ASCITIS / PERITONEAL ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | LIQUIDO PERITONEAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 5 |
| LIQUIDO ASCITIS / PERITONEAL ESTUDIO CITO QUIMICO | SIN DEFINIR | TUBO ESTERIL / TAPA ROJA | | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| LIQUIDO ASCITIS / PERTIONEAL ESTUDIO BIOQUIMICO | LIQUIDO ASCITIS | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | COORDIANR CON EL LAC | 5 |
| LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO ESTUDIO CITOQUÍMICO | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | COORDIANR CON EL LAC | 4 |
| LIQUIDO DE PUNCIÓN ESTUDIO CITOQUIMICO | SIN DEFINIR | TUBO ESTERIL / TAPA ROJA | | 7 |
| LIQUIDO PERICÁRDICO ESTUDIO CITOQUIMICO | LIQ PERICÁRDICO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| LÍQUIDO PERITONEAL ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | LIQ.PERITONEAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 5 |
| LIQUIDO PERITONEAL ESTUDIO CITO QUÍMICO | SIN DEFINIR | TUBO ESTERIL / TAPA ROJA | | 7 |
| LÍQUIDO PLEURAL ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | LIQUIDO PLEURAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 5 |
| LIQUIDO PLEURAL ESTUDIO CITOQUIMICO | SIN DEFINIR | TUBO ESTERIL / TAPA ROJA | | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| LIQUIDO SINOVIAL ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | LIQUIDO SINOVIAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 5 |
| LIQUIDO SINOVIAL ESTUDIO CITO QUÍMICO | SIN DEFINIR | TUBO ESTERIL / TAPA ROJA | | 7 |
| LISOSOMAL TRASTORNOS DE ALMACENAMIENTO PANEL DE 6 ENZIMAS LEUCOCITARIAS (LSD6W) EN SANGRE | SANGRE ENTERA ACD | ACD TAPÓN DORADO | | 12 |
| LITIO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| LKM Anticuerpos Anti DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| LLC-B ANALISIS DE HIPERMUTACION SOMATICA IGH (BCLL) EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | EDTA / TAPÓN LILA | | 17 |
| LLC-B ANALISIS DE HIPERMUTACION SOMATICA IGH (BCLL) EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | La muestra debe ser enviada al laboratorio el mismo día o al siguiente de la extracción, de lunes a jueves. Enviar a temperatura ambiente o refrigerada. | 15 |
| LSD [DIETILAMIDA ÁCIDO LISÉRGICO] (FLSDA) CUANTIFICACIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA MCL | | 10 |
| Ma1 AC.ANTI [ANTI NEURONALES] DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| MACROPROLACTINA (MCRPL) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| MAG AUTO AC. ANTI GLICOPROT. ASOC A MIELINA (MAGES) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 19 |
| MAGNESIO (FMAGR) DETERMINACIÓN EN GLÓBULOS ROJOS | EDTA METAL FREE | EDTA METAL FREE | | 10 |
| MAGNESIO DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas | 3 |
| MAGNESIO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| MAG-SGPG / MAG Ab IGM (FMGS) CONFIRMATORIO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 19 |
| MANGANESO (MNB) DETERMINACIÓN EN SANGRE ENTERA | SANGRE TOTAL | EDTA METAL FREE | Ayuno mínimo de 8 horas. Recolectar la sangre en tubo especial para metales proporcionado por el laboratorio. | 9 |
| MANGANESO (MNS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | TUBO SECO METALES | Ayuno mínimo de 8 horas. Recolectar la sangre en tubo especial para metales proporcionado por el laboratorio. Centrifugar la muestra luego de 30 minutos de la extracción. Dentro de las 4 horas siguientes a la recolección transferir el suero cuidadosamente sin usar pipeta a un tubo seco limpio y sin gel proporcionado por el laboratorio. | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| MANGANESO DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Orina de 24 horas. (Se puede solicitar en Muestra aislada.) | 9 |
| MARCADORES TUMORALES DE OVARIO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno de 8 horas. | 3 |
| MARIHUANA - CANNABIS (THC) DETECCIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| MA-TA ANTICUERPOS ANTI (FRMTA) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 10 |
| MA-TA ANTICUERPOS ANTI (FRMTA) EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 10 |
| MA-TA ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |
| MA-TA ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |
| MDA-5 (CADM-140) AC ANTI (FAMDA) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 14 |
| MECP2 ESTUDIO DEL GEN (ME2MS) EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 18 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| MELATONINA (FMELA) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 15 |
| MEMBRANA BASAL GLOMERULAR AC.ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| MEPERIDINA & NORMEPERIDINA (FMEP) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE ENTERA HEPARINIZADA | HEPARINA | | 13 |
| MERCURIO (HG) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | METLAL FREE EDTA | Al final de la última jornada semanal. Ayuno mínimo de 8 horas. Recolectar la sangre en tubo especial para metales proporcionado por el laboratorio. | 7 |
| MERCURIO (HGRCR) DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |
| MERCURIO (HGU) DETERMINACIÓN EN ORINA DE 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas. | 7 |
| META ANFETAMINAS DETECCIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| METADONA & METABOLITOS (MDNS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 6-8 horas. Centrifugar en las dos horas siguientes a la extarcción. Enviar refrigerado. | 13 |
| METAHEMOGLOBINA DETERMINACIÓN EN SANGRE | Sangre Entera (heparina) | HEPARINA | Efectuar la extracción con jeringa específica de Gasometría y enviarla refrigerada a la brevedad al laboratorio. | 1 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| METANEFRINAS FRACCIONADAS (METAF) DETERMINACIÓN EN ORINA 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones. | 8 |
| METANEFRINAS FRACCIONADAS (METAR) DETERMINACIÓN EN ORINA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| METANEFRINAS LIBRES FRACCIONADAS (PMET) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA EDTA | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno de 6 a 8 horas. Centrifugar y separar el plasma antes de pasadas dos horas post extracción. El uso de adrenalina inyectable en los últimos 7 días puede alterar los resultados del estudio. | 7 |
| METANOL (VLTU) INVESTIGACIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| METFORMINA (FMETF) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA EDTA | EDTA / TAPÓN LILA | | 14 |
| METIL HIPÚRICO ÁCIDO DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Al final de la jornada laboral. | 15 |
| METILEN TETRA HIDROFOLATO REDUCTASA (MTHFR-C677T) ESTUDIO GENÉTICO EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Ayuno mínimo 8 horas. Esta prueba requiere de un tubo de edta exclusivo para su procesamiento. | 20 |
| METILFENIDATO RITALINA (RIT) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE ENTERA HEPARINIZADA | HEPARINA | Ayuno de 8 horas. Realizar la extracción y enviar al laboratorio el tubo con hielo.<br>En caso de trasladar la muestra: luego de la extracción enfriar la sangre entera en hielo durante al menos 10 minutos, luego centrifugar, separar y enviar el plasma con cadena de frío. | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| METOTREXATE DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Centrifugar antes de las 2hs de la extracción. Enviar la muestra protegida de la luz. | 3 |
| MHPG 3-METOXI 4-HIDROXIFENILETILENGLICOL DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas. | 15 |
| MI-2 ANTICUERPO (FMI2) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 20 |
| MIASTENIA GRAVIS EVALUACIÓN INICIAL DEL ADULTO (MGA1) EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 11 |
| MICOFENOLATO DE MOFETILO (MPA) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 5 |
| MICOLÓGICO CULTIVO DEFINITIVO | A DEFINIR | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 30 |
| MICOLÓGICO ESTUDIO COMPLETO | SIN DEFINIR | | | 30 |
| MICROARRAY CROMOSÓMICO (CMAPT) EN TUMOR | ANATOMÍA PATOLÓGICA | ANATOMÍA PATOLÓGICA | | 21 |
| MICROARRAY CROMOSÓMICOS CONGÉNITO (CMACB) ESTUDIO EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA + HEPARINA SÓDICA | | 25 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| MICRODELECIONES DEL CROMOSOMA Y (YMCRO) DETECCIÓN MOLECULAR | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | La muestra debe ser enviada al laboratorio el mismo día o al siguiente de la extracción, de lunes a jueves. Enviar a temperatura ambiente o refrigerada. | 13 |
| MICROSOMAL AC.ANTI TIROIDEOS (TPO) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| MICROSPORIDIA INVESTIGACIÓN POR TINCIÓN (MTBS) EN MATERIA FECAL | COPROPARASITARIO / MATERIA FECAL | FRASCO TAPA VERDE / COPROPARASITARIO | | 7 |
| MIELINA ANTICUERPOS ANTI IGG (ZW131-90570) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 12 |
| MIOCARDITIS / PERICARDITIS PANEL (FMPP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 12 |
| MIOGLOBINA DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA RECIÉN EMITIDA | MIOGLOBINA URINARIA | Requiere contenedor específico. Se requiere orina recién emitida. Transportar al laboratorio antes de la hora o colectar la orina en el contenedor específico. | 6 |
| MIOGLOBINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| MITOTANE (FMITO) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE ENTERA HEPARINIZADA | HEPARINA | | 10 |
| MORFINA (FMORS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | | 12 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| MORFINA SCREENING EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada | 3 |
| MPL EXON 10 DETECCIÓN DE MUTACIÓN (MPLVS) EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 8 |
| MSP DENGUE-CHIKUNGUNYA-ZIKA-F.AMARILLA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo de 8 horas. | 10 |
| MSP ENFERMEDAD DE CHAGAS ESTUDIO CONFIRMATORIO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | | 10 |
| MSP HIV PRUEBA CONFIRMATORIA | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo de 8 horas. | 7 |
| MSP SARAMPIÓN VIRUS ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| MSP SARS-Co-V-2 SECUENCIACIÓN GENOMA VIRAL | Nasofaríngea | Medio de Transporte UTM | | 30 |
| MSP SÍFILIS ESTUDIO CONFIRMATORIO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | | 10 |
| MSP VIRUELA SÍMICA EVALUACIÓN | A DEFINIR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| MUCOPOLISACÁRIDOS CUANTITATIVOS (MPSQU) DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 13 |
| MULTÍMEROS DEL FACTOR VON WILLEBRAND (VWFM2) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA CITRATO | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Muestra: plasma c/citrato pobre en plaquetas (1 ml). Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 17 |
| MÚSCULO CARDÍACO AC.ANTI IgG DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| MÚSCULO ESTRIADO (STR) AC. ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 5 |
| MUSCULO LISO Anticuerpos Anti DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| MUTACIÓN T315I DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Ayuno mínimo 8 horas. | 20 |
| MYCN 2p24(MYCNF) NEUROBLASTOMA FISH EN TEJIDO | TEJIDO | TACO DE PARAFINA / LÁMINAS | | 13 |
| MYCOBACTERIUM AVIUM- DNA INTRACELULAR PCR CUALITATIVA DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 24 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (MTBRP) DETECCIÓN POR PCR EN ASP.GASTRICO | ASP.GÁSTRICO | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 1 |
| MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DETECCIÓN POR PCR DETERMINACIÓN EN ABSCESO | BK ABSCESO | TUBO ESTÉRIL | | 1 |
| MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DETECCIÓN GENEXPERT PCR EN EXPECTORACIÓN | EXPECTORACIÓN | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DETECCIÓN PCR GENEXPERT EN LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DETECCIÓN PCR GENEXPERT EN LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS GENEXPERT PCR DETECCIÓN EN LÍQUIDO PLEURAL | LIQUIDO PLEURAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DETECCIÓN PCR EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | | 5 |
| MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DETECCIÓN POR PCR EN OTRAS MUESTRAS | A DEFINIR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS QUANTIFERON TEST QFT4 | SANGRE TOTAL | TUBOS ESPECÍFICOS | Kit de extracción proporcionado por el laboratorio. Coordinar con el laboratorio. Ver Manual de Instrucciones. | 8 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| MYCOPLASMA EN ESPERMA ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | ESPERMA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Medio de transporte específico. Coordinar con el laboratorio para su envío. | 5 |
| MYCOPLASMA EN ORINA ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | MYCOPLASMA HOMINIS | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Medio de transporte específico. Coordinar con el laboratorio | 5 |
| MYCOPLASMA ESTUDIO EN SECRECIÓN URETRAL ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | MYCOPLASMA HOMINIS | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Medio de transporte específico. Coordinar con el laboratorio | 5 |
| MYCOPLASMA ESTUDIO EN SECRECIÓN VAGINAL ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | MYCOPLASMA HOMINIS | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Medio de transporte específico. Coordinar con el laboratorio | 5 |
| MYCOPLASMA GENITALIUM (MGRP) DETERMINACIÓN EN EXUDADO VAGINAL | VAGINAL PCR | VAGINAL CON MEDIO PCR | | 7 |
| MYCOPLASMA GENITALIUM PCR DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA PCR | ORINA PCR | | 3 |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE AC.ANTI CONFIRMATORIO (MYCO) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 10 |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE AC.ANTI IGG-M DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno de 8 horas. | 7 |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE (MPRP) DETERMINACIÓN EN LCR | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 8 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE PCR (MPRP) DETERMINACIÓN EN LIQUIDO PERICÁRDICO | Líquido pericárdico | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 8 |
| MYCOPLASMA UROGENITALES AC.ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo de 8 horas. | 15 |
| MYD88,L265P MUTACIÓN SOMÁTICA PCR DNA ALÉLICA ESPECÍFICA (MYD88) EN MÉDILA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | EDTA / TAPÓN LILA | | 9 |
| N-ACETYLGALACTOSAMINE-6-SULFATASE (G6SW) ACTIVIDAD EN LEUCOCITOS | SANGRE ENTERA ACD | ACD TAPÓN DORADO | La muestra debe ser enviada al laboratorio el mismo día o al siguiente de la extracción, de lunes a jueves. Enviar a temperatura ambiente o refrigerada. | 48 |
| NEISSERIA GONORRHOEAE PCR DETERMINACIÓN EN EX.VAGINAL | VAGINAL PCR | VAGINAL CON MEDIO PCR | | 3 |
| NEISSERIA GONORRHOEAE PCR DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA PCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones. | 3 |
| NEISSERIA MENINGITIDIS AC ANTI IGG (FNMEN) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 14 |
| NEISSERIA MININGITIDIS IGG AC. ANTI RESPUESTA/VACUNA (FNMEN) DET. EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 14 |
| NEUROTRANSMISORES (FNTSM) DETERMINACIÓN EN L.C.R | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Coordinar con el laboratorio. | 24 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| NICOTINA Y METABOLITOS (NICOS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| NÍQUEL (NIS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Altas concentraciones de gadolinio o yodo interfieren con la mayoría de las pruebas de metales. Si se ha administrado un medio de contraste que contenga gadolinio o yodo, no se debe recoger la muestra hasta pasadas 96 horas. | 10 |
| NÍQUEL DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Al final de la jornada laboral. | 15 |
| NITRÓGENO (NTU) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 8 |
| NMO NEUROMIELITIS ÓPTICA AC ANTI EN SANGRE | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 30 |
| NOROVIRUS ARN (FNORO) INVESTIGACIÓN EN HECES | MATERIA FECAL | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada. | 15 |
| NORTRIPTILINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas / realizar toma antes de ingerir medicamento. | 7 |
| N-TERMINAL PRO BNP (PBNP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Centrifugar y separar el suero antes de las 2 hs. post extracción. Durante las 12 hs. previas a la extracción no ingerir multivitaminas o suplementos dietéticos que contengan biotina (vitamina B7) que se encuentran comúnmente en suplementos de pelo, piel y uñas. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| OLANZAPINA (FLNZ) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA HEPARINIZADO | HEPARINA SÓDICA | | 14 |
| OLIGOSACÁRIDOS [Screening](OLINR) DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada. | 20 |
| ONCOHEME NGS (PANEL 47 GENES) NEOPLASIAS MIELOIDES (NGSHM) DETERMINACIÓN EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | EDTA / TAPÓN LILA | | 25 |
| ONCOHEME NGS (PANEL 47 GENES) NEOPLASIAS MIELOIDES (NGSHM) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 25 |
| OPIÁCEOS (OPATU) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA MCL | | 10 |
| ORINA COMPLETA | ORINA FRESCA | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Primera orina de la mañana | 3 |
| ORINA MINUTADA | ORINA DE 3 HORAS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones. | 3 |
| ORINA MORFOLOGÍA ERITROCITARIA | ORINA RECIÉN EMITIDA | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Primera orina de la mañana o recolectada al azar. Enviar al laboratorio a la brevedad. | 3 |
| ORÓTICO ÁCIDO (OROT) DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTAR AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 18 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ORTO - CRESOL (METABOLITO DEL TOLUENO) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Al final de la jornada laboral. | 15 |
| OSMOLARIDAD DETERMINACIÓN EN ORINA 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| OSMOLARIDAD DETERMINACIÓN EN SANGRE | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| OSMOLARIDAD URINARIA MUESTRA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada | 3 |
| OSTEOCALCINA (OSCAL) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 12 horas. Durante las doce horas previas a la extracción no tomar multivitaminas o suplementos dietéticos que contengan Biotina o Vitamina B7 que se encuentran comúnmente en suplementos de pelo, piel y uñas. | 7 |
| OVARIO Anticuerpos Anti DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| OXALATO (OXU) DETERMINACIÓN EN ORINA (OXALURIA) | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas (no ingerir grandes dosis de Vitamina C durante la recolección). | 8 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| OXALATO (POXA1) DETERMINACIÓN EN PLASMA | HEPARINA SÓDICA | HEPARINA SÓDICA | Ayuno de 12 hora. Los pacientes deben evitar tomar suplementos de vitamina C durante 24 horas antes de la toma de muestra. Se debe hacer la extracción con sangre en tubo con Heparina de Sodio (provisto por el LAC).<br>Luego de la extracción:<br>1. Coloque la muestra en hielo húmedo inmediatamente.<br>2. Centrifugar durante 10 minutos a 3500 rpm dentro de 1 hora de la recolección. El uso de una centrífuga refrigerada a 4 grados C es óptimo pero no obligatorio.<br>3. Alícuota de plasma en un vial de plástico.<br>4. Ajuste el pH de la muestra de plasma a un pH de 2,3-2,7 con aproximadamente 10 mcL de ácido clorhídrico concentrado (12 M) (o 20 mcL de HCl 6 M) por 1 ml de plasma.<br>Información adicional: Se pueden aceptar muestras no acidificadas si el plasma heparinizado se congela correctamente. Se agregará un descargo de responsabilidad en plasma no acidificado, "La muestra se recibió no acidificada y congelada. En muestras no acidificadas, los valores de oxalato pueden aumentar espontáneamente". Aunque puede haber un pequeño aumento absoluto de oxalato plasmático en muestras no acidificadas, esto no cambiará la interpretación clínica. | 12 |
| OXALATO PEDIÁTRICO (ROXU) DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 8 |
| OXALURIA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |
| OXCARBAZEPINA METABOLITO DE (OMHC) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | Ayuno mínimo 8 horas / realizar toma antes de ingerir medicamento. Centrifugar y separar el suero antes de las 2 horas post extracción. | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| OXISTEROL (OXNP) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA EDTA | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 11 |
| PAI INHIBIDOR DEL ACTIVADOR DEL PLASMINOGENO DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA CITRATO | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |
| PANEL DE AGENTES DE MENINGITIS / ENCEFALITIS QIASTAT (15 AGENTES) PCR EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 1 |
| PANEL DE AGENTES DE NEUMONIA DETERMINACIÓN PCR | LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 1 |
| PANEL DE AUTO ANTICUERPOS EVALUACIÓN PARA N (PAC1) EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 20 |
| PANEL DE AUTO ANTICUERPOS EVALUACIÓN PARA N (PAVAL) EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo de 8 horas. Si se envía suero enviar 4 mL. | 20 |
| PANEL DE INTOXICACIÓN DE ANTICOAGULANTES DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 18 |
| PANEL DE VIRUS PCR DETERMINACIÓN EN CÓRNEA - VÍTREO | CÓRNEA PCR | CÓRNEA SUERO FISIOLÓGICO | | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| PANEL GASTROINTESTINAL (22 AGENTES) DETERMINACIÓN EN MATERIA FECAL | MATERIA FECAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 1 |
| PANEL PARA HEMOCULTIVOS (BCID) 24 AGENTES | HEMOCULTIVO | HEMOCULTIVO | | 1 |
| PANEL RESPIRATORIO FILM ARRAY(22 AGENTES) EN HISOPADO NASO-FARÍNGEO | NASOFARÍNGEA | MEDIO DE TRANSPORTE UTM | Ver Manual de Instrucciones. | 1 |
| PANEL RESPIRATORIO QIASTAT (21 AGENTES) EN HISOPADO NASO-FARÍNGEO | NASOFARÍNGEA | MEDIO DE TRANSPORTE UTM | | 1 |
| PANORAMA / NATERA PRUEBA BÁSICA PRE NATAL NO INVASIVA EN SANGRE MATERNA | PANORAMA NIPT | PANORAMA NIPT | Coordinar con el laboratorio. | 15 |
| PANORAMA / NATERA PRUEBA EXTENDIDA PRE NATAL NO INVASIVA EN SANGRE MATERNA | PANORAMA NIPT | PANORAMA NIPT | Coordinar con el laboratorio. | 15 |
| PARA AMINO FENOL DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Al final de la jornada laboral. | 15 |
| PARACETAMOL / ACETAMINOFENO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 2 |
| PARACOCCIDIOIDES BRASILIENSIS AC.ANTI IGG-M (ZW76) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 12 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| PARAINFLUENZA VIRUS (TIPOS 1 -4) RNA DETECCIÓN MOLECULAR EN LAVADO BRONQUIOALVEO | LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |
| PARAPARESIA ESPÁSTICA HEREDITARIA PANEL DE GENES (HSPP) NGS DETERMINACION EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 85 |
| PARAPLEGINA SPG7 DNA (ZW127-632) PRUEBA DE SECUENCIACIÓN | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 50 |
| PARÓTIDA INMUNOFENOTIPO | ANATOMÍA PATOLÓGICA | ANATOMÍA PATOLÓGICA | | 5 |
| PAROTIDITIS ANTICUERPOS ANTI (CMUMP) DETERMINACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |
| PAROTIDITIS ANTICUERPOS ANTI (MMPGM) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| PAROXETINA (PARO) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | Ayuno mínimo 8 horas. Realizar la extracción justo antes de recibir la siguiente dosis del medicamento. Enviar 2mL de suero. Centrifugar y separar el suero antes de las 2 horas post extracción, y enviar la muestra refrigerada. | 10 |
| PARVO VIRUS B19 ANTICUERPOS ANTI (PARV) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| PARVOVIRUS (PARVO) PCR DETECCIÓN L.AMNIÓTICO | LÍQUIDO AMNIÓTICO | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| PARVOVIRUS B19 PARVP DETECCIÓN POR PCR EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 10 |
| PAUL BUNNEL REACCIÓN DE (AC. HETERÓFILOS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| PDGFRB, 5q33.1 (FFPDG ) FISH DETERMINACIÓN EN SANGRE | Heparina sódica | Heparina sódica | | 15 |
| PEF-ISOTIPOS POR MALDITOF-MS (SPISO) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 6 |
| PEPTIDO C (CPR) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. Durante las doce horas previas a la extracción no tomar multivitaminas o suplementos dietéticos que contengan Biotina o Vitamina B7 que se encuentran comúnmente en suplementos de pelo, piel y uñas. Si se va a enviar la muestra centrifugar y separarla antes de las dos hs. post-extracción. | 6 |
| PEPTIDO-C (ZW76 / 003236) DETERMINACIÓN EN ORINA DE 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones para recolección de orina de 24 horas. | 9 |
| PEPTIDO CÍCLICO CITRULINADO ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| PEPTIDOS SOLUBLES RELACIONADOS CON LA MESOTELINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 11 |
| PERFIL LIPÍDICO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| PH EN MATERIA FECAL | MATERIA FECAL | FRASCO / MATERIA FECAL | Muestra aislada | 3 |
| PH EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Primera orina de la mañana | 3 |
| PIGF (FACTOR DE CRECIMIENTO PLACENTARIO) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | | 3 |
| PIRUVATO (PYRC) DETERMINACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 11 |
| PIRUVATO DESHIDROGENASA COMPLEJO EN CULTIVO DE FIBROBLASTOS | CULTIVO DE FIBROBLASTOS DE PIEL | TUBO ESTÉRIL RPMI (MML) | | 20 |
| PIRUVATO QUINASA ERITROCITARIA (PK) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 7 |
| PITX2 SECUENCIACIÓN DEL GEN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 40 |
| PLAQUETAS | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Sin ayuno. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| PLAQUETAS ANTICUERPOS ANTI (PLABN) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | Ayuno de 8 horas. Se requiere de la siguiente información para la solicitud de esta prueba:<br>- Dato clínico (motivo por el que se solicita la prueba).<br>- Recibió el paciente terapia de inmunoglobulina intravenosa (IVIg) en el último mes?<br>- Recibió el paciente trasfusión plaquetaria dentro de las 72 horas previas a recolectar la muestra?<br>- Recuento plaquetario más reciente. | 7 |
| PLAQUETAS CON CITRATO | SANGRE ENTERA CITRATO | CITRATO / TAPÓN CELESTE Tubo único | | 3 |
| PLASMA RICO EN PLAQUETAS | SANGRE TOTAL | CITRATO / TAPÓN CELESTE | | 1 |
| PLASMINÓGENO ACTIVIDAD (PSGN) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | | 6 |
| PLASMODIOS BÚSQUEDA EN SANGRE PERIFÉRICA (MALARIA) | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Se recomienda ayuno de 4 horas | 3 |
| PLATA DETERMINACIÓN (AGS) EN SUERO | SUERO | Tubo seco Metales | Recoger la sangre en tubo especial para metales proporcioando por el laboratorio. | 10 |
| PLOMO (PBDV) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | METAL FREE EDTA | Ayuno 4 horas. Recolectar la sangre en tubo especial para metales proporcionado por el laboratorio. | 7 |
| PML/RAR ALFA CUANTIFICACIÓN (PMLR) EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | La muestra debe recibirse en el laboratorio el mismo día de la extracción los días lunes, miércoles o viernes antes de las 10:00. Enviar refrigerada. | 12 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| PML/RAR ALFA CUANTIFICACIÓN (PMLR) EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA OSEA | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 12 |
| PML/RAR ALFA DETECCIÓN EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA OSEA | EDTA / TAPÓN LILA | | 7 |
| PML/RAR ALFA DETECCIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 7 |
| PMP22 DUPLICACIONES & DELECIONES (PMP22) ANÁLISIS FISH EN SANGRE | SANGRE ENTERA HEPARINIZADA | HEPARINA | | 13 |
| PNEUMOCYSTIS JIROVECII (CARINII) IFD LAVADO BRONQUIO ALVEOLAR | LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| PNEUMOCYSTIS JIROVECII (CARINII) PCR CUANTITATIVA EN LAVADO BRONQUIO ALVEOLAR | LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 2 |
| POBLACIONES LINFOCITARIAS AMPLIADA EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Ayuno mínimo 2 horas (enviar la muestra de lunes a viernes de mañana). Enviar dato clínico. | 7 |
| POBLACIÓN LINFOCITARIA CÉLULAS T EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Enviar dato clínico. | 7 |
| POBLACIONES LINFOCITARIAS COMPLETAS EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Ayuno mínimo 2 horas (enviar la muestra de lunes a viernes de mañana). Enviar dato clínico. | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| POBLACIONES LINFOCITARIAS SIMPLES EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Ayuno mínimo 2 horas. | 3 |
| POILPEPTIDO PANCREATICO DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno de 8 horas. | 12 |
| POLG SECUENCIACIÓN DEL GEN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Extraer dos tubos de EDTA. Enviar a temperatura ambiente. | 35 |
| POLIMIOSITIS-DERMATOMIOSITIS PANEL DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 5 |
| POLIMIOSITIS-DERMATOMIOSITIS PANEL 3 (FMMPP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 24 |
| POLIMORFISMO DEL PAI (FPAIG) 4G/5G GENOTIPIFICACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | Ayuno de 8 horas. | 10 |
| POLIOVIRUS ANTICUERPOS ANTI (FPOLO) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 11 |
| POLIPEPTIDO PANCREATICO DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | Ayuno de 8 horas. | 12 |
| POLIPEPTIDO VASOACTIVO INTESTINAL (VIP) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno de 8 horas. | 11 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| POLIPEPTIDO VASOACTIVO INTESTINAL (VIP) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno de 8 horas. | 11 |
| POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA RECESIVA (ARPKD) SECUENCIACIÓN DEL GEN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 20 |
| PORFIRINAS (FQPPS) DETERMINACIÓN EN MATERIA FECAL | MATERIA FECAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones. | 12 |
| PORFIRINAS (PQNRU) DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Proteger de la luz (enviar la muestra los lunes antes de las 10:00 am).<br>No ingerir alcohol las 24 hrs previas a la recolección de la muestra. | 15 |
| PORFIRINAS (PQNU) DETERMINACIÓN EN ORINA DE 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Proteger de la luz. La muestra debe ser enviada al laboratorio el mismo día o al siguiente de la recolección, de lunes a jueves. Enviar refrigerada o congelada. Ver Manual de Instrucciones para recolección de orina de 24 horas. No se debe ingerir alcohol las 24 horas previas ni durante la recolección de la muestra de orina de 24 horas. | 8 |
| PORFIRINAS EVALUACIÓN EN SANGRE (eritocitos lavados, PEWE). | SANGRE ENTERA | EDTA / TAPÓN LILA derivación | Ver Manual de Instrucciones. | 14 |
| PORFIRINAS FRACCIONADAS (PFP) DETERMINACIÓN REFLEJA EN PLASMA | PLASMA CONGELADO | EDTA / TAPÓN LILA | | 10 |
| PORFIRINAS TOTALES (PTP) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA CONGELADO | EDTA / TAPÓN LILA | Enviar plasma congelado o tubo de EDTA en el día de la toma. Proteger de la luz. | 9 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| PORFOBILNÓGENO DEAMINASA (PBGD_) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | El paciente debe absetenerse de beber alcohol en las 24 horas previas a la toma de la muestra. La muestra debe ser refrigerada apenas efectuada la extracción. | 7 |
| POTASIO ANTICUERPOS ANTI CANALES DEPENDIENTES DE VOLTAJE (VGKC) DETERMINACION EN | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 15 |
| POTASIO DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas | 3 |
| POTASIO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| PRADER-WILLI/ANGELMAN SINDROME (PWAS) ANÁLISIS MOLECULAR EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 24 |
| PREALBÚMINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 6 |
| PREGABALINA (PGN) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | La extracción debe realizarse justo antes de la siguiente dosis. Asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, centrifugar y separar el suero. Enviar al laboratorio el suero refrigerado. | 10 |
| PREGNENOLONA (PREGN) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| PREOPERATORIO CONTROL | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO + SUERO + PLASMA CITRATADO + ORINA FRESCA | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / TUBO CITRATO / TAPÓN CELESTE + FRASCO DE ORINA | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| PREOPERATORIO SIN ORINA CONTROL | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO + SUERO + PLASMA CITRATADO | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / TUBO CITRATO / TAPÓN CELESTE | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| PRIMIDONA (PRMB) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 20 |
| PROCAINAMIDA Y N-ACETYLPROCAINAMIDA (PA) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| PROCALCITONINA CUANTITATIVA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 1 |
| PRODUCTO DE DEGRADACIÓN DE FIBRINÓGENO DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |
| PROGESTERONA HORMONA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA 9 PREVENCIÓN | PLASMA FLUORURO + SUERO | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |
| PROINSULINA (PINS) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno de 8 horas. Realizar la extracción y enviar al laboratorio el tubo con hielo. En caso de trasladar la muestra: luego de la extracción enfriar la sangre entera en hielo durante al menos 10 minutos, luego centrifugar, separar y enviar el plasma con cadena de frío. | 12 |
| PROLACTINA 2 TOMAS DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| PROLACTINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| PROLACTINA TRES TOMAS DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| PROSTAGLANDINA D2 (FD2PG) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 18 |
| PROSTAGLANDINA D2 (PG D2)) DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 22 |
| PROSTAGLANDINA E (ZW71/MML1376) DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 22 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| PROSTAGLANDINA E2 (FPGE2) DETERMINACIÓN EN ORINA 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 14 |
| PROTEÍNA "A" ASOCIADA AL EMBARAZO [PAPP-A] DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. La muestra debe ser tomada el mismo día de la ecografía transnucal. Este estudio se puede realizar solamente hasta la semana 13 de embarazo. Enviar junto con la muestra la ecografía transnucal y formulario correspondiente. | 3 |
| PROTEÍNA C DE LA COAGULACIÓN DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA CITRATO | CITRATO / TAPÓN CELESTE | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |
| PROTEÍNA C REACTIVA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas | 3 |
| PROTEÍNA C REACTIVA ULTRASENSIBLE DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas | 3 |
| PROTEÍNA CATIÓNICA EOSINOFÍLICA (FECP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | | 15 |
| PROTEÍNA F100B (F100B) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | | 22 |
| PROTEÍNA FIJADORA DEL RETINOL (FREB) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 12 horas. | 15 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| PROTEÍNA S LIBRE DE LA COAGULACIÓN DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA CITRATO | CITRATO / TAPÓN CELESTE | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |
| PROTEÍNA UNIDA AL RETINOL (RBP24) DETERMINACIÓN EN ORINA 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas. | 20 |
| PROTEÍNA UNIDA AL RETINOL (RRBP) DETERMINACIÓN EN ORINA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Primera orina de la mañana. | 10 |
| PROTEÍNAS FRACCIONADAS DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| PROTEÍNAS TOTALES DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| PROTEINOGRAMA ELECTROFORÉTICO (EBF) EN LÍQUIDO PLEURAL | LIQUIDO PLEURAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 6 |
| PROTEINOGRAMA ELECTROFORÉTICO EN ORINA | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas | 5 |
| PROTEINOGRAMA ELECTROFORÉTICO EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 5 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| PROTEINURIA - ALBUMINURIA DETERMINACIÓN | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas | 3 |
| PROTOPORFIRINAS ERITROCITARIAS (PPFWE) EN GLÓBULOS ROJOS LAVADOS | Heparina sódica | Heparina sódica | Preparación del paciente: el paciente debe abstenerse de beber alcohol durante 24 horas.Recipiente/Tubo de Recolección: / Preferido: Green top (heparina sódica)Cuando la muestra llegue al laboratorio:Envase/tubo de envío: vial de plásticoVolumen de muestra: Suspensión de eritrocitos lavadosInstrucciones de recolección: Recoja y procese la muestra de sangre completa de la siguiente manera:1. Transfiera la muestra completa a un tubo de centrífuga graduado de 12 ml.2. Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 2000 rpm.3. Registre el volumen de las células empaquetadas y el volumen total de la muestra.4. Deseche el plasma sobrenadante.5. Lavar los eritrocitos empaquetados 2 veces resuspendiendo al menos una cantidad igual de solución salina fría al 0,9 %, mezclar y centrifugar durante 5 minutos a 2000 rpm, descartando el sobrenadante después de cada lavado.6. Vuelva a suspender las células empaquetadas hasta el volumen total original con solución salina al 0,9 %. Invierta la muestra suavemente para mezclar.7. Transferir los eritrocitos lavados a un vial de plástico y congelar. | 8 |
| PROTOPORFIRINAS FRACCIONADAS (PPFE) DETERMINACIÓN EN SANGRE | Heparina sódica | Heparina sódica | | 6 |
| PROTROMBINA 20210 ESTUDIO GENÉTICO EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| PROTROMBINA ANTICUERPOS ANTI IGG-M DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | | 14 |
| PROTROMBINA TIEMPO DE (CON INR) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE | Ayuno mínimo de 2 horas | 3 |
| PSEUDOLCOLINESTERASA TOTAL (PCHE1) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 6 |
| PTH INTACTA CON CALCIO DETERMINACIÓN EN PLASMA | PTH - PLASMA EDTA + SUERO | PTH-EDTA + SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Se requiere ayuno de 6 a 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado.<br>Durante las ocho horas previas a la extracción no tomar multivitamínicos o suplementos dietéticos que contengan Biotina (Vitamina B7) la cual se encuentra comúnmente en suplementos para de pelo, piel y uñas. | 3 |
| PTH PÉPTIDO RELACIONADO (PTHrP) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | Ayuno de 8 horas. Mínimo 1 ml plasma c/edta. Colocar el tubo en un recipiente con icepack (mantener cadena de frío hasta que llegue al laboratorio). Para el caso que la muestra venga desde el interior: sacar el tubo de EDTA y ponerlo en un recipiente con icepack. Centrifugar separar el plasma y congelarlo. | 8 |
| PTHI-PARATHORMONA MOLECULA INTACTA EN PLASMA | PTH - PLASMA EDTA | PTH-EDTA | Se requiere ayuno de 6 a 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado.<br>Durante las ocho horas previas a la extracción no tomar multivitamínicos o suplementos dietéticos que contengan Biotina (Vitamina B7) la cual se encuentra comúnmente en suplementos para de pelo, piel y uñas. | 3 |
| QT LARGO SÍNDROME PANEL MULTI GEN (LQTGP) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 45 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| QUETIAPINA (FQUET) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| QUILOMICRONES TEST DE | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |
| QUIMOTRIPSINA DETERMINACIÓN EN HECES | MATERIA FECAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada | 15 |
| RABIA ANTICUERPOS ANTI (FRFIT) DETERMINACION EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 35 |
| REARREGLOS CROMOSÓMICOS Y FUSIÓN DE GENES DIRIGIDOS (SARCP) EN SARCOMAS | ANATOMÍA PATOLÓGICA | ANATOMÍA PATOLÓGICA | | 21 |
| RECIÉN NACIDO CORDÓN GRUPO SANGUINEO Y RH | SANGRE EDTA GRUPOS | EDTA / TAPÓN LILA | | 1 |
| RECTAL HISOPADO | A DEFINIR | HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE | | 5 |
| RECUENTO CELULAR | LIQUIDO ASCITIS | LÁMINA | | 4 |
| RECUENTO PLAQUETARIO CON CITRATO | SANGRE TOTAL | CITRATO / TAPÓN CELESTE | | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| RENINA ACTIVIDAD (PRA) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | EDTA / TAPÓN LILA | Ayuno de 8 horas. Intrucciones de recolección:<br>* Mantener tubos previamente refrigerados.<br>* Extraer la sangre con el paciente en posición sentada en un tubo con EDTA enfriado.<br>* Colocar inmediatamente luego de la recolección el tubo de EDTA en un baño de agua/hielo hasta que se enfríe completamente.<br>* Enviar al laboratorio en cadena de frio dentro la siguiente media hora de la recolección.<br>* Si esto no fuera posible, centrifugar la muestra enfriada, separar el plasma y congelar.<br>* Enviar al Laboratorio la muestra de plasma congelada.<br>Si estas opciones no son posibles, coordinar la extracción en el LAC. Ver Manual de Instrucciones. | 9 |
| RESERVA ALCALINA DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE ENTERA (heparina) | HEPARINA | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| RESISTENCIA - FRAGILIDAD GLOBULAR | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Enviar la muestra al laboratorio de lunes a jueves antes del mediodía. Se requieren 2 tubos edta para adultos y 2 ml de sangre entera para niños. | 3 |
| RESISTENCIA A LA INSULINA ÍNDICE | PLASMA FLUORURO | FLUORURO / TAPÓN GRIS | | 3 |
| RESISTENCIA A LA PROTEÍNA C ACTIVADA DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA CITRATO | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 10 |
| RESPIRATORIO SINCICIAL VIRUS ANTICUERPOS ANTI (SRSV) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 8 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| RETICULOCITOS EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Se recomienda ayuno de 4 horas | 3 |
| RH FACTOR | SANGRE EDTA GRUPOS | EDTA / TAPÓN LILA | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| Ri ANTICUERPOS ANTI [ANNA-2] DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| RIBONUCLEOPROTEÍNAS AC.ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| RIBOSOMA P ANTICUERPOS ANTI IG.G (RIB) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 7 |
| RISPERIDONA (FRISP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | Ayuno mínimo 8 horas. | 10 |
| RITALINA METILFENIDATO (RIT) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | Ayuno de 8 horas. Realizar la extracción y enviar al laboratorio el tubo con hielo.<br>En caso de trasladar la muestra: Luego de la extracción enfriar la sangre entera en hielo durante al menos 10 minutos, luego centrifugar, separar y enviar el suero con cadena de frío. | 10 |
| RNA POLIMERASA III IG.G (RNAP) ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 12 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| RO/SS-A ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| ROTAVIRUS- ANTÍGENOS DETERMINACIÓN EN MATERIA FECAL | MATERIA FECAL | FRASCO / MATERIA FECAL | Muestra aislada | 3 |
| RUBEOLA Ig.G - Anticuerpos Anti RBPG DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| RUBEOLA IGG - IGM ANTICUERPO ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| RUBEOLA IGM ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| RUBEOLA VIRUS PCR CUALITATIVA (ZW83/16730) DETERMINACIÓN EN LÍQUIDO AMNIÓTICO | LÍQUIDO AMNIÓTICO | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 8 |
| RUTINAS PASIVO | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO +SUERO + ORINA FRESCA | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |
| RUTINAS PASIVO SIN ORINA | SANGRE TOTAL + PLASMA FLUORURO +SUERO | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS | | 3 |
| SANGRADO FETO-MATERNO CITOMETRÍA DE FLUJO (FMB) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 6 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL | MATERIA FECAL | FRASCO / MATERIA FECAL | Muestra aislada | 3 |
| SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL (2) | MATERIA FECAL | FRASCO / MATERIA FECAL | Muestra aislada | 3 |
| SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL (3) | MATERIA FECAL | FRASCO / MATERIA FECAL | Muestra aislada | 3 |
| SANGRÍA TIEMPO DE | SANGRE ENTERA EN TUBO SECO | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA / SUERO | Ver Manual de Instrucciones. | 3 |
| SARAMPIÓN ANTICUERPOS ANTI (ROGM) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| SARAMPIÓN DETERMINACIÓN EN EXUDADO NASO FARÍNGEO MSP | FAUCES | ASPIRADO NF / EX. NASAL | | 7 |
| SARCOMA SINOVIAL REARREGLO 18q11.2 (SS18F) FISH EN TEJIDO | ANATOMÍA PATOLÓGICA | ANATOMÍA PATOLÓGICA | | 14 |
| SARS-CoV-2 ANTICUERPOS IGG ANTI SPIKE DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno de 8 horas. | 5 |
| SARS-CoV-2 ANTICUERPOS IGM ANTI SPIKE DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno de 8 horas. | 1 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| SARS-CoV-2 ANTICUERPOS TOTALES ANTI NUCLEOCÁPSIDE DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno de 8 horas. | 5 |
| SARS-CoV-2 ANTÍGENO DETERMINACIÓN EN SECRECIÓN NASOFARÍNGEA | Nasofaríngea | Medio de Transporte UTM | | 0,5 (12 horas) |
| SARS-CoV-2 FilmArray EN SECRECIÓN RESPIRATORIA | Nasofaríngea | Medio de Transporte UTM | | 1 |
| SARS CoV 2 GeneXpert EN SECRECIÓN RESPIRATORIA | FAUCES | ASPIRADO NF / EX. NASAL | | 1 |
| SCA13 EXON SELECTO DNA (ZW127-284) PRUEBA DE SECUENCIACIÓN | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 25 |
| SCL 70 Anticuerpos Anti DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| SCN1A EVALUACIÓN COMPLETA EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 50 |
| SECRECIÓN DE TRAQUEOSTOMIA ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | A DEFINIR | HISOPO SIN MEDIO DE TRANSPORTE | | 5 |
| SEGUNDA OPINIÓN AP (70012) | AP | AP | | 15 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| SELENIO (SES) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | Tubo seco Metales | Ayuno mínimo 8 horas. Recolectar la sangre en tubo especial para metales proporcionado por el laboratorio. Centrifugar la muestra luego de 30 minutos de la extracción y transferir el suero cuidadosamente sin usar pipeta a un tubo seco limpio y sin gel proporcionado por el laboratorio. | 5 |
| SELENIO (SEUR) DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 12 |
| SEROTONINA (SER) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ver Manual de Instrucciones. | 9 |
| SEROTONINA / 5-HIDROXITRIPTAMINA (SERU) DETERMINACIÓN EN ORINA DE 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones. | 8 |
| SEROTONINA ENSAYO DE LIBERACIÓN HEPARINA NO FRACCIONADA (FPORC) EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 11 |
| SEROTONINA GENOTIPO DEL RECEPTOR HTR2A & HTR2C (HTR2V) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 12 |
| SERTRALINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas / realizar toma antes de ingerir medicamento. | 7 |
| SHBG GLOB. TRANSP. HORMONA SEXUAL DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| SHIGELLA DYSENTERIAE AC ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 20 |
| SHIGELLA SONNEI AC ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 20 |
| SIÁLICO ACIDO ((ZW99/84275) DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 16 |
| SIALOTRANSFERRINAS ESTUDIO DE DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| SIDEREMIA - TRANSFERRINA % DE SATURACIÓN | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| SIDEREMIA DETERMINACIÓN DE HIERRO EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| SÍFILIS PRUEBA DE TAMIZAJE RPR REACCIÓN DE EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| SÍFILIS TAMIZAJE TREPONEMA PALLIDUM AC ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| SILICIO (FSILS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | METAL FREE S/A | Ayuno mínimo de 8 horas. Recolectar la sangre en tubo especial para metales proporcionado por el laboratorio. | 15 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| SINDROMES MIELODISPLÁSICOS FISH EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA OSEA | HEPARINA | | 15 |
| SIROLIMUS (SIIRO) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 7 |
| SLA Anticuerpos Anti DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| SM ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| SODIO DETERMINACIÓN EN MATERIA FECAL | MATERIA FECAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada. | 15 |
| SODIO DETERMINACIÓN EN ORINA (NA) | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas | 3 |
| SODIO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| SOLVENTES AROMÁTICOS PANEL (2416U) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Recolectar la orina al final de la jornada laboral.<br>Enviar la muestra refrigerada.<br>Incluye:<br>Ácido 2-Metilhipurico; Ácido 3 y 4 Metilhipúrico; Ácido Hipúrico; Ácido Mandélico; Ácido Metilhipúrico; Fenol -Total; p y/o m-Cresol; Ácido Fenilglioxílico ; o-Cresol; Ácido S-Fenilmercaptúrico; Ácido t,t-Mucónico. | 15 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| SOMATOSTATINA (FSOMA) DETERMINACIÓN EN PLASMA | Plasma G.I. | Plasma G.I. | El paciente debe estar en ayunas de 10-12 horas antes de la toma de muestra.<br>El paciente no debe estar ingiriendo ningún medicamento antiácido o medicamentos que afecten la secreción de insulina o la motilidad intestinal, si es posible, durante al menos 48 horas antes de la toma de muestra.<br>Separar el plasma lo antes posible y congelarlo. Enviar la muestra congelada. | 15 |
| SPOROTHRIX ANTICUERPOS ANTI (SSP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 8 |
| SRP ANTICUERPOS ANTI (FSRP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 20 |
| STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE AC.ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo de 8 horas. | 15 |
| STREPTOCOCCCUS PNEUMONIAE IG.G AC ANTI SEROTIPOS (PN23) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 10 |
| STRONGYLOIDES AC.ANTI IGG (STRNG) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 9 |
| SUCCINILACETONA (ZW242/ 2007401) DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 23 |
| SULFÁTIDOS ANTICUERPOS ANTI (FSUAB) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo de 8 horas. Si se envía suero enviar 2 mL. | 20 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| SULFATO (SULFU) DETERMINACIÓN EN ORINA 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas. | 7 |
| SULFONILUREAS (FSLFU) TAMIZAJE EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 12 |
| T3 L TRIIODOTIRONINA LIBRE DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| T4 LIBRE TIROXINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| TACROLIMUS DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Ayuno de 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| TALIO (TLB) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | METAL FREE EDTA | Ayuno mínimo de 8 horas. Recolectar la sangre en tubo especial para metales proporcionado por el laboratorio. | 8 |
| TALIO (TLCRU) DETERMINACIÓN EN ORINA MUESTRA AISLADA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 9 |
| T-CELLS LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (TALLF) FISH EN MÉDULA ÓSEA | HEPARINA SÓDICA | HEPARINA SÓDICA | | 13 |
| T-CELLS LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (TALLF) FISH EN SANGRE | SANGRE ENTERA (HEPARINA) | HEPARINA | | 13 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| TCR REORDENAMIENTO DEL GEN (TCGBM) DETERMINACIÓN EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | EDTA / TAPÓN LILA | | 13 |
| TCR REORDENAMIENTO DEL GEN (TCGR) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 13 |
| TEOFILINA-AMINOFILINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas / realizar toma antes de ingerir medicamento | 3 |
| TEST BIOQUÍMICO PRIMER TRIMESTRE | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | | 3 |
| TESTOSTERONA BIODISPONIBILIDAD (TTFB) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| TESTOSTERONA LIBRE DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO IM | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Centrifugar el tubo y separar el suero. Enviar al laboratorio refrigerado el mismo día de la extracción. Si no fuera posible, luego de separar el suero, congelarlo. Asegurarse de que llegue al laboratorio el suero congelado. | 7 |
| TESTOSTERONA TOTAL DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción | 7 |
| TETRASIALOGANGLIÓSIDOS GQ1b Ig.G (FGQ1B) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| TIBBLING ÍNDICE DE (ÍNDICE IgG) | SUERO / LCR | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación / TUBO ESTÉRIL | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADO (APTT) | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE | Ayuno mínimo 8 horas. Mantener el tubo en ambiente refrigerado y asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si no fuera posible, separar el plasma y congelar. Enviar al laboratorio congelado. Ver en Manual de Instrucciones para pruebas especiales, HEMOSTASIS ESPECIALIZADA. | 1 |
| TIFUS MURINO (FMTAG) IGG ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 7 |
| TIMIDINA / DEOXI URIDINA DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 35 |
| TIOCIANATO (FFTIO) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE ENTERA (heparina) | HEPARINA | | 9 |
| TIOCIANATOS (ZW86-4440U) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Al final de la jornada laboral. | 15 |
| TIOPURINA METILTRANSFERASA (GTPMT) & HIDROLASA NUDIX (NUDIT15) (TPNUV) GENOTIPIFICACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | Enviar la muestra a temperatura ambiente o refrigerada. | 6 |
| TIOPURINA METIL-TRANSFERASA (TPMT3) PERFIL DE ACTIVIDAD EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | La muestra debe ser enviada al laboratorio el mismo día o al siguiente de la extracción, de lunes a jueves. Enviar a temperatura ambiente o refrigerada. | 9 |
| TIROGLOBULINA AC.ANTI TIROIDEOS DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| TIROGLOBULINA MASA (TGMS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 9 |
| TIROGLOBULINA TG DETERMINACIÓN DE SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| TIROIDEOS Anticuerpos Anti (ATA) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| TIROSINA DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 15 |
| TIROSINA QUINASA AC. ANTI RECEPTOR (MUSK) DETERMINACIÓN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 13 |
| TIROXINA LIBRE INIDCE (FRTUP) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 6 |
| TIROXINA [T4] TOTAL DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas.<br>Esta prueba no puede utilizarse en pacientes que reciben tratamiento con agentes hipolipemiantes que contienen dextrotiroxina, a menos que se interrumpa la terapia durante 4 a 6 semanas para permitir que se restablezca el estado fisiológico. | 6 |
| TOPIRAMATO PICO DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | Ayuno mínimo 8 horas / realizar toma antes de ingerir medicamento. | 5 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| TOPIRAMATO VALLE (TOPI) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | Ayuno mínimo 8 horas. | 5 |
| TOXOCARA ANTICUERPOS ANTI (TOXOC) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 5 |
| TOXOIDE DIFTÉRICO AC.ANTI (DIPGS) DETERMIANCIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 8 |
| TOXOIDE TETÁNICO AC.ANTI IGG (TTIGS ) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 8 |
| TOXOPLASMA GONDII (PTOX) DETERMINACIÓN EN LÍQUIDO AMNIÓTICO | LÍQUIDO AMNIÓTICO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 6 |
| TOXOPLASMA GONDII (PTOX) PCR DETERMINACIÓN EN LCR | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 10 |
| TOXOPLASMA GONDII ADN (TOXB) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPO ANTI IGG-M (FFTGI) DETERMINACIÓN EN LCR | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 11 |
| TOXOPLASMA GONDII Ig.G - M AC.ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| TOXOPLASMA GONDII IG.G AC. ANTI - AVIDEZ DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| TOXOPLASMA GONDII Ig.G AC.ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| TOXOPLASMA GONDII IG.M AC.ANTI (IFI) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| TOXOPLASMA GONDII Ig.M AC.ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| TOXOPLASMA GONDII PCR EN LÍQUIDOS, LESIONES & OTROS | A DEFINIR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 5 |
| TOXOPLASMA GONDII (PTOX) DETERMINACIÓN EN LÍQUIDO AMNIÓTICO | LÍQUIDO AMNIÓTICO | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 6 |
| TP53 (P53MS) SECUENCIACIÓN DEL GEN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 23 |
| TP53 GEN DELECIÓN (17p13.1) DETERMINACIÓN EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | | 3 |
| TP53 GEN DELECIÓN (17p13.1) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE ENTERA HEPARINIZADA | HEPARINA | | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| TPHA (TREPONEMA PALLIDUM) DETERMINACIÓN EN LCR | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| TPHA (TREPONEMA PALLIDUM) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 2 |
| Tr ANTICUERPOS ANTI [ANTI NEURONALES] DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXAL.(ASAT) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| TRANSAMINASA GLUTÁMICO PIRUV. (ALAT) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| TRANSFERRINA DEFICIENTE EN CARBOHIDRATOS (CDG) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 15 |
| TRANSFERRINA DEFICIENTE EN CARBOHIDRATOS ADULTOS (CDTA) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 10 |
| TRANSFERRINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| TRANSFERRINA RECEPTOR SOLUBLE (STFR) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | | 6 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| TRANSGLUTAMINASA ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| TRANSGLUTAMINASA IGA AC. ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| TRANSGLUTAMINASA IGG AC. ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | | 7 |
| TRASLOCACIÓN (11;14) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE ENTERA HEPARINIZADA | HEPARINA | Enviar dato clínico. | 30 |
| TRASLOCACIÓN (11;14) INVESTIGACIÓN EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | Enviar dato clínico. | 30 |
| TRASLOCACIÓN (11;18) INVESTIGACIÓN EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | Enviar dato clínico. | 30 |
| TRASLOCACIÓN t(8,21) DETERMINACIÓN EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | Enviar dato clínico. | 10 |
| TRASLOCACIÓN t(14;16) (q32;q22) INVESTIGACIÓN EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | Enviar dato clínico. | 30 |
| TRASLOCACIÓN (14;18) INVESTIGACIÓN EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | Enviar dato clínico. | 30 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| TRASLOCACIÓN (15;17) DETERMINACIÓN EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | Enviar dato clínico. | 6 |
| TRASLOCACIÓN (4;14) (p16;q32) INVESTIGACIÓN EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | Enviar dato clínico. | 30 |
| TREPONEMA PALLIDUM AC ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| TREPONEMA PALLIDUM AC ANTI SÍFILIS PRUEBA DE TAMIZAJE DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| TRICHINELLA SPIRALIS ANTICUERPOS ANTI (STRIC) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 15 |
| TRICHOMONA VAGINALIS BÚSQUEDA EN ORINA | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada | 5 |
| TRIGLICÉRIDOS DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |
| TRIIODOTIRONINA [T3] TOTAL DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 8 |
| TRIIODOTIRONINA T3 REVERSA (RT3) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| Tripanosoma Cruzi BÚSQUEDA EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| TRIPTASA (TRYPT) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| TRISOMÍA DEL CROMOSOMA 12 DETERMINACIÓN EN MÉDULA ÓSEA | MÉDULA ÓSEA | HEPARINA | | 20 |
| TRISOMÍA DEL CROMOSOMA 12 DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE ENTERA HEPARINIZADA | HEPARINA | | 20 |
| TROMBINA TIEMPO DE (TT) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA | CITRATO / TAPÓN CELESTE derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| TROMBOSPONDINA TIPO 1 DOM 7A ANTICUERPO ANTI (THSD7) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 14 |
| TROMBOELASTOGRAMA | SANGRE TOTAL | CITRATO / TAPÓN CELESTE | Esta prueba se realiza de lunes a jueves. Debe realizarse la extracción de una muestra de sangre con citrato de sodio 3.2%, entre las 12:00 y 13:00 horas con un ayuno de 4 horas. La muestra debe ser enviada en carácter de urgencia al LAC, a temperatura ambiente (debe llegar antes de las 2 horas de realizada la extracción). Agradecemos se comunique al laboratorio. | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| Tropheryma whipplei (WHIPB) PCR DETECCIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 10 |
| Tropheryma whipplei (TWRP) PCR DETERMINACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | La muestra debe ser enviada al laboratorio el mismo día o al siguiente de la recolección, de lunes a jueves. Enviar refrigerada o congelada. | 10 |
| Tropheryma whipplei (TWRP) PCR DETERMINACIÓN EN TEJIDO | AP | AP | | 11 |
| TROPONINA T ULTRA SENSIBLE DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 1 |
| TROPONINA T (TRPS) 5 GENERACIÓN DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE ENTERA (heparina) | HEPARINA | | 4 |
| TSH-TIROTROFINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| TSI ANTIRECEPTOR DE TSH (THYRO) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 7 |
| U1 RNP ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO | | 7 |
| UDP-1A1 (HIPERSENSENSIBILIDAD AL IRINOTECAN) ESTUDIO EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 10 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| UREA CLEARENCE DE | SUERO + ORINA 24 HS | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO + FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ayuno mínimo 8 horas. Ver Manual de Instrucciones. | 3 |
| UREA CLEARENCE ESTUDIO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| UREA DETERMINACIÓN EN LÍQUIDO PERITONEAL | LÍQUIDO PERITONEAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 1 |
| UREA DETERMINACIÓN EN ORINA DE 24 HORAS | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas | 3 |
| UREA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| UREAPLASMA SP (URRP) DETERMINACIÓN EN EXUDADO VAGINAL | VAGINAL PCR | VAGINAL CON MEDIO PCR | | 7 |
| UREAPLASMA UREALYTICUM EN ESPERMA ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | ESPERMA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Medio de transporte específico. Coordinar con el laboratorio para su envío. | 5 |
| UREAPLASMA UREALYTICUM EN EXUDADO URETRAL ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | SECRECIÓN URETRAL | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Medio de transporte específico. Coordinar con el laboratorio | 5 |
| UREAPLASMA UREALYTICUM EN ORINA ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | UREAPLASMA UREALYTICUM | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Medio de transporte específico. Coordinar con el laboratorio | 5 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| UREAPLASMA UREALYTICUM EN SECRECIÓN VAGINAL ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | UREAPLASMA UREALYTICUM | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Medio de transporte específico. Coordinar con el laboratorio | 5 |
| URÉMICO HEMOLÍTICO ATÍPICO SD.PANEL DE COMPLEMENTO (AHUSD) DETERMINACIÓN EN SUERO & PLASMA | SUERO + PLASMA | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO + CITRATO / TAPÓN CELESTE | El paciente debe estar preferentemente en ayunas, y las muestras no deben ser extraídas dentro de las 48 hrs después de un cambio de plaquetas. Se deben centrifugar y freezar dentro de los 30 minutos de extraídas. | 24 |
| URÉMICO HEMOLÍTICO SINDROME ATÍPICO / MICROANGIOPATÍA TROMBÓTICA (AHUSP) PANEL GENÉTICO | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 60 |
| UROCULTIVO ESTUDIO BACTERIOLÓGICO | ORINA FRESCA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones. | 5 |
| UROPORFIRINOGENO DECARBOXILASA (UPGD) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. El paciente no debe consumir alcohol durante las 24 hs. previas a la extracción. | 11 |
| V.D.R.L. / RPR REACCIÓN SÍFILIS PRUEBA DE TAMIZAJE DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| V.D.R.L. REACCIÓN DE DETERMINACIÓN EN LCR | LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| VALORACIÓN GENERAL | SANGRE TOTAL + SUERO + FLUORURO + ORINA | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS / FRASCO DE ORINA | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |
| VALORACIÓN GENERAL SIN ORINA | SANGRE TOTAL + SUERO + FLUORURO | TUBO EDTA / SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO / FLUORURO TAPÓN GRIS | Ayuno mínimo 10 horas | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| VAN DE KAMER (GRASAS EN MATERIA FECAL) | MATERIA FECAL | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones. | 20 |
| VANCOMICINA DETERMINACIÓN EN LÍQUIDO BIOLÓGICO | Líquido de Punción | TUBO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 3 |
| VANCOMICINA (PICO) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO TOMA DOS | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| VANCOMICINA (VALLE) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. | 3 |
| VARICELA ZOSTER PCR DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA derivación | | 3 |
| VARICELLA ZOSTER ADN EN MUESTRAS INUSUALES | A DEFINIR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| VARICELLA ZOSTER Anticuerpos Anti (VZGM) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 7 |
| VARICELLA ZOSTER Anticuerpos Anti IGG (FVZGC) DETERMINACIÓN EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Enviar 1 ml de LCR. | 10 |
| VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (VES) | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA | Se recomienda ayuno de 4 horas | 3 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| VENLAFAXINA DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas / realizar toma antes de ingerir medicamento. | 15 |
| VIGABATRINA [VIGA] DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE ENTERA HEPARINIZADA | HEPARINA | Ayuno de 8 horas. | 12 |
| VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL (WNCSF) DETECCIÓN MOLECULAR EN LCR | LCR | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 8 |
| VIRUS RESPIRATORIOS EN SECRECIÓN NASO-FARÍNGEA | FAUCES | Aspirado NF / Ex. Nasal | Aspirado naso-faríngeo para niños menores de 2 años. Para mayores de 2 años dos hisopos, uno sin medio de transporte y el otro sumergido en el tubo con medio UTM. | 2 |
| VISCOSIDAD (VISCS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | Extraer la muestra en tubo seco SIN gel. Mantener la muestra a 37ºC. Separar y refrigerar. Nos pueden enviar al paciente para hacer la toma si lo consideran necesario. | 7 |
| VITAMINA A RETINOL (VITA) EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 12 a 14 horas. | 6 |
| VITAMINA B1 - TIAMINA TDP DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno de 12 a 14 horas. Proteger de la luz. Asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 24 horas de la recolección. Si esto no es posible, congelar y enviar la muestra al laboratorio congelada. | 12 |
| VITAMINA B12 DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 3 |
| VITAMINA B12 TRANSCOBALAMINA CAPACIDAD DE UNIÓN (ZW51-90490) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 12 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| VITAMINA B2 (VITB2) DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA CITRATO | HEPARINA | Se requiere ayuno de 12 a 14 horas. Proteger de la luz. Asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Si esto no fuera posible, centrifugar, separar el plasma y acondicionar en tubo protegido de la luz. Enviar al laboratorio el plasma refrigerado o congelado. | 7 |
| VITAMINA B3 NIACINA (VITB3) EN PLASMA | Plasma EDTA | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno de 4 a 8 horas.<br>Centrifugar la muestra y separar el plasma dentro de las 2 horas de la recolección. | 8 |
| VITAMINA B6 (B6PRO) PERFIL DETERMINACIÓN EN PLASMA | PLASMA HEPARINA | HEPARINA | Se requiere ayuno de 12 a 14 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos 24 horas antes de la extracción. Asegurarse que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Proteger de la luz. Si esto no fuera posible, centrifugar, separar el plasma, acondicionar en tubo protegido de la luz y congelar. Enviar al laboratorio el plasma congelado. | 15 |
| VITAMINA D 1-25 DI HIDROXI DHVD DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 8 |
| VITAMINA D 25 HIDROXI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO CON GEL / TAPÓN AMARILLO | Ayuno mínimo 8 horas. Evitar el consumo de suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan Biotina (vitamina H, B7 y B8) por al menos 8 horas antes de la extracción. | 2 |
| VITAMINA E (alfa-TOCOFEROL) VITE DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo de 8 horas. Proteger de la luz. | 6 |
| VITAMINA K1 (VITK1) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 12 horas. Proteger de la luz. | 9 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| VORICONAZOL (VORI) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO SIN GEL / TAPÓN ROJO | Centrifugar la muestra dentro de las 2 horas siguientes a la recolección. Si esto no es posible, separar el suero y enviar al laboratorio una alícuota de 2 mL. | 6 |
| WARFARINA (FWARP) DETERMINACIÓN EN PLASMA | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| WARFARINA SENSIBILIDAD GENOTIPIFICACIÓN (WARSQ) EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 13 |
| WAS GEN WISKOTT-ALDRICH SINDROME-X-LINKED TROMBOCITOPENIA (ZW194-440) EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 28 |
| WEBER SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL | MATERIA FECAL | FRASCO / MATERIA FECAL | Muestra aislada | 3 |
| WILLIAMS SINDROME (WS7F) DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE ENTERA HEPARINIZADA | HEPARINA | | 14 |
| WILSON ENFERMEDAD (WDZ) SECUENCIACIÓN COMPLETA DEL GEN ATP7B EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | | 23 |
| X FRAGIL (FXS) ESTUDIO MOLECULAR DETERMINACIÓN EN SANGRE | SANGRE TOTAL | EDTA / TAPÓN LILA Derivación | Enviar la muestra a temperatura ambiente.<br>La muestra debe recibirse en el laboratorio el mismo día de la extracción, los días lunes, miércoles o viernes antes de las 10:00. Enviar a temperatura ambiente o refrigerada. | 15 |
| YERSINIA ENTEROCOLÍTICA ANTICUERPOS ANTI (FYERS) DETERMINACION EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno de 8 horas. | 19 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| Yo ANTICUERPOS ANTI [PCA-1] DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | Ayuno mínimo 8 horas. | 15 |
| ZIKA VIRUS CAPTURA - IGM (MZIKV) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 9 |
| ZIKA ANTICUERPOS ANTI DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 21 |
| ZIKA VIRUS ANTICUERPOS ANTI IGG-M DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 3 |
| ZIKA VIRUS ANTICUERPOS ANTI IGM DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO | | 3 |
| ZIKA VIRUS DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 10 |
| ZIKA VIRUS RT-PCR (RZIKS) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 12 |
| ZIKA VIRUS RT-PCR (FZIKU) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | | 9 |

| Prueba | Muestra | Contenedor | Condiciones | Resultado (Dias) |
|---|---|---|---|---|
| ZINC (ZN_S) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | TUBO SECO METALES | Ayuno mínimo de 8 horas. Recolectar la sangre en tubo especial para metales proporcionado por el laboratorio. Centrifugar la muestra luego de 30 minutos de la extracción. Dentro de las 4 horas siguientes a la recolección transferir el suero cuidadosamente sin usar pipeta a un tubo seco limpio y sin gel proporcionado por el laboratorio. | 6 |
| ZINC (ZNU) DETERMINACIÓN EN ORINA | ORINA 24 HS | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Ver Manual de Instrucciones por recolección de orina de 24 horas.<br>Altas concentraciones de gadolinio o yodo interfieren con la mayoría de las pruebas de metales. Si se ha administrado un medio de contraste que contenga gadolinio o yodo, no se debe recoger la muestra hasta pasadas 96 horas. | 10 |
| ZINC TRANSPORTADOR 8 ANTICUERPOS ANTI (EXNT8) DETERMINACIÓN EN SUERO | SUERO | SECO C/ GEL / TAPÓN AMARILLO derivación | | 8 |
| ZOLPIDEM (PDSU) DETECCIÓN EN ORINA | ORINA MUESTRA AISLADA | FRASCO ESTÉRIL / TAPA ROJA | Muestra aislada. | 10 |