

核准日期

左旋多巴片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：左旋多巴片

商品名称：思利巴


英文名称：Levodopa Tablets

汉语拼音：Zuoxuan Duoba Pian

【成份】左旋多巴

化学名称：3-羟基-L-酪氨酸

化学结构式：



分子式：C₉H₁₁NO₄

分子量：197.19

【性状】本品为薄膜包衣片，除去包衣后显白色或类白色。

【适应症】用于儿童、青少年中屈光不正性弱视、屈光参差性弱视以及斜视性弱视患者。

【规格】0.125g

【用法用量】

口服。5~6 周岁，每次 0.125g（一片），开始三天每天 50mg（小半片），每日二次。

7~12 周岁，每次 0.25g（二片），开始三天每天用 0.125g（一片），每日二次，早晚饭后口服，四周为一疗程，一般用 1~3 个月或遵医嘱。

【不良反应】

1. 较常见的反应有恶心、呕吐、心悸、体位性低血压等，一般程度均轻，不需处理。
2. 使用过程偶可见眼睑痉挛，高血压，胃痛等。

【禁忌】

严重精神疾患、严重心律失常、心力衰竭、青光眼、消化道溃疡和有惊厥史者禁用。

【注意事项】

1. 有严重心血管、肺、支气管、肾、肝及内分泌疾病患者应谨慎用药。
2. 接受单胺氧化酶抑制剂（如苯乙肼、异唑肼）使用者，需停药两周后方可使用本品。
3. 5 岁以下儿童慎用。
4. 本品不宜长期连续（一年以上）使用。
5. 过量使用本品偶见一过性血钾下降，血浆醛固酮升高，血尿素氮轻度升高，血清谷丙转氨酶、乳酸脱氢酶、碱性磷酸酶与胆红素升高，多数患者停药后能自行恢复正常。
6. 本品应在眼科医生的指导下使用。
7. 如有不良反应发生，应立即就医。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

本品可分泌入乳汁，也会减少乳汁分泌；动物实验表明本品可引起内脏和骨骼畸形。孕妇及哺乳期妇女应禁用。

【儿童用药】 本药用于儿童、青少年中弱视患者。

【老年用药】 本药适应对象为儿童和青少年，不推荐老年人使用。

【药物相互作用】

1. 本品与非选择性单胺氧化酶抑制剂合用可致急性肾上腺危象。
2. 本品与罂粟碱或维生素 B₆ 合用，可降低本品的药效。
3. 本品与乙酰螺旋霉素合用，可显著降低本品的血药浓度，药效减弱。
4. 本品与利血平合用，可抑制本品的作用，应避免合用。
5. 本品与抗精神病药物合用，因为两者互相拮抗，应避免合用。
6. 本品与甲基多巴合用，可增加本品的不良反应并使甲基多巴的抗高血压作用增强。

【药物过量】

中毒症状：超剂量时可使上述不良反应明显加重，并可导致严重心律失常。

处理：立即催吐、洗胃，采取增加排泄措施，并依病情进行相应对症治疗和支持疗法。

【药理毒理】

一、本品对弱视动物模型的改善视觉作用

1. 对弱视大鼠使用本品溶液灌胃，每天一次，于用药第四周弱视大鼠的视觉—行动反应时间明显缩短，并有显著的统计学意义。
2. 对弱视家猫动物模型使用本品片剂灌胃处理，每天一次，于用药第二周起，弱视猫的视觉—行动反应时间显著减少，于用药第四周，其反应时间缩短有极显著的统计学意义。

二、本品对人体视功能的作用

据报导，视网膜中央有多巴胺能神经，从外界给予多巴可以增加神经元中的递质贮存。使用本品能改善人体视觉对比敏感度，减少固视暗点及提高视力。

【药代动力学】

口服本品后由小肠吸收。约 30~50% 进入体循环，但只有小于 1% 的剂量进入中枢神经系统，绝大部分在脑外代谢成多巴胺，后者不能进入中枢神经系统或视网膜，80% 的本品于 24 小时内降解成高香草酸，二羟苯乙酸等，经肾脏排泄。

【贮藏】遮光，密封保存。

【包装】铝塑包装 （1）每板 12 片，每盒 1 板（2）每板 12 片，每盒 2 板

【有效期】24 个月

【执行标准】《中国药典》2005 年版二部

【批准文号】国药准字 H10970321

【生产企业】

企业名称：艾康礼德制药（浙江）有限公司

生产地址：浙江省衢州市经济开发区乐园路 306 号

邮政编码：324000

电话号码：0570-3851810

传真号码：0570-3098677