

## Tretinoin 軟膠囊

主成份：Tretinoin

商品名：Vesanoid Soft Gelatin Capsule

中文商品名：凡善能軟膠囊

含量：10 毫克/膠囊

作用：

急性前骨髓性白血病的誘導緩解劑。

劑量與用法：

本藥需由醫師處方，劑量及用法請務必遵照醫囑或藥袋上之指示服藥，有任何疑問應請教醫師或藥師。

注意事項：

1. 使用本藥期間需經常檢測白血球值及肝功能指數等。
2. 如果您曾對 tretinoin、isotretinoin、vitamin A、etretinate、或 paraben 類（為 Vesanoid 膠囊中防腐劑）過敏者，請勿使用本藥。
3. 如您正在使用其它處方或非處方藥品，特別是 ketoconazole、cimetidine、erythromycin、verapamil、diltiazem、phenobarbital、pentobarbital、rifampin、cyclosporine 或類固醇等藥品，請務必告知醫師。
4. 若您有肝臟疾病或高血脂，用藥前請先告知醫師。
5. 本藥具極高的致畸胎性，因此用藥前應確定未懷孕，用藥期間及停藥後一個月內必須進行有效避孕。使用本藥前一週及用藥期間每個月都應做懷孕測試。如發現懷孕，請立即告知醫師；服用本藥請勿授乳。

忘記服藥時該怎麼辦？

想起時儘快服用，若想起時已經接近下一次服藥時間，則跳過一次，依照原來下一次的服用時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

| 症狀                                                   | 如何處理           |
|------------------------------------------------------|----------------|
| 不明原因的發燒、呼吸困難或短促、體重增加、視力有問題、嚴重頭痛、胸部疼痛、嚴重口腔疼痛、骨頭疼痛或發疹等 | 請立即就醫          |
| 皮膚乾燥、口乾、鼻腔乾燥、沒有食慾、噁心、嘔吐、輕微頭痛、感覺虛弱或疲倦等                | 症狀嚴重或持續時，請告知醫師 |
| 如發生其它可能與本藥有關的副作用                                     | 請告知醫師          |

藥品該如何存放？

請參考藥袋說明。